

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷十七

雜病源流犀燭

六淫門

燥病源流

沈金鑒撰

經曰。諸澀枯涸乾勁皺揭。皆屬于燥。夫陽明燥金。乃肺與大腸之氣也。故燥之爲病。皆陽寔陰虛。血液衰耗所致。條分之。雖有風燥。熱燥。火燥。氣虛燥之殊。要皆血少火多之故。是以外則皮膚皺揭。中則煩渴。上則咽鼻乾焦。下則溲赤便難。陽有餘而陰不足。肺失清化之源。腎乏滋生之本。痿消噎變。皆本于此。治法惟以滋金養血爲主。宜滋所謂熱燥病在裡者也。耗人津液。故便秘消渴生焉。宜大補所謂風燥病在表者也。肌膚枯毛髮槁。故乾疥爪枯生焉。宜養所謂火燥病亦在裡者也。東垣云。饑飽勞役。損傷胃氣。及食辛辣厚味而助火邪。伏于肺中。耗散真陰。津液虧少。故大便燥結。

而其燥結。又有風燥熱燥陽結陰結之殊。治法總惟辛以潤之。苦

以瀉之。

宜大黃黃芩黃連黃柏連喬山梔元參知母石膏童便當歸木通麻仁甘菊柏子仁酸漿梨汁

而此熱燥

風燥火燥其原摠不外氣血之虛燥。蓋惟氣血之虛先有致燥之

由。故風熱火相感而成病也。然氣虛之燥其症則為痿痺以肺熱

不能管攝一身也。血虛之燥其症則為噎膈以胃槁不能收納飲

食也。

氣虛燥宜以黃芪為君黃柏為臣黃芩為使血虛燥宜以歸身為君白芍為臣生地為佐

其本病亦有易

見者。至于燥病之發不一。瘳治之方亦不一。試列舉之一切燥熱

可概治也。

宜大補地黃丸

咽乾鼻燥必清上部也。

宜清涼飲

大腸風秘燥結必

理中焦也。

宜鎮風潤氣丸辛潤湯元戎四物湯

皮膚皸裂血出肌肉燥痒是火刑金

必清肺以保金也。

宜加減四物湯

筋燥爪枯必滋養其榮血也。

宜養榮湯

皮膚

拆手足爪甲枯搔之屑起血出痛楚必養血以澤膚也。

宜生血潤膚飲

瓊脂

膏天門冬膏

腸胃枯燥大便秘結必清燥以潤腸也。

宜當歸承氣湯

如是而燥

病有不愈者哉。

脉法 入門曰傷燥脉澁。正傳曰脉緊而澁或浮而弦或芤而遲皆燥脉也。

燥病原由症治 類聚曰燥者肺金之本燥金受熱化以成燥澁由風能勝熱熱能耗液而成燥也燥于外則皮膚皴揭而癢痒燥于中則精血枯涸燥于上則咽鼻乾焦燥于下則便尿閉結故曰燥爲肺金病也宜當歸承氣湯。正傳曰火熱勝則金衰而風生緣風能勝濕熱能耗液而爲燥陽寔陰虛則風熱勝于水濕而爲燥也蓋肝主筋而風氣自甚又燥熱加之則筋太燥也燥金主于收斂故其脉緊澁而爲病勁強緊急而口噤也夫燥之爲病血液衰少不能榮養百骸故也。入門曰經云燥者潤也養血之謂也積液固能生氣積氣亦能生液宜服瓊玉

膏又曰皮膚皺揭拆裂血出大痛。或皮膚癢痒爪甲浮起乾枯。皆火燥肺金燥之甚也。宜以四物湯去川芎合生脉散加天冬花粉知母黃柏酒紅花生甘草之類。東垣曰榮衛枯涸濕劑所以潤之。二冬人參杞子五味同爲生脉之劑。葉氏醫案曰燥有由心陽過動傷液者。一老人舌腐肉消肌枯。心事繁冗陽氣過動致五液皆涸而爲燥。冬月無妨夏月深處林壑心境凝然。每早服牛乳一杯又曰上燥治氣下燥治血此定評也。今陽明胃腑之虛因久病嘔逆投以辛耗破氣津液劫傷胃氣不主下行致腸口傳送失司。經云六腑以通爲補半月小效全在一通補工夫豈徒理燥而已。議甘寒清補胃陰用鮮生地天冬人參甜梨肉生白蜜又曰陽津陰液重傷餘熱淹留不解臨晚潮熱苦色若赭頻飲救亢陽焚燔究未能解渴形脉俱虛難投自

虎當以仲景復脈一法爲邪少虛多使少陰厥陰二臟之陰少  
駐冀得胃關復振因左關尺空數不藏非久延所宜耳此亦治  
熱劫陰液之法也用人參生地阿膠麥冬桂枝炙草生姜大棗  
華岫雲曰燥爲乾澁不通之候內傷外感宜分外感者由于  
天時風熱過勝或因深秋偏亢之邪始必傷人上焦氣分法以  
辛涼甘潤肺胃爲先喻氏清燥救肺湯是也內傷者乃人之本  
病精血下奪而成或因偏餌燥劑所致病從下焦陰分先起法  
以純陰靜藥柔養肝腎爲宜大補地黄丸六味丸是也要知是  
症大忌苦澁最喜甘柔若氣分失治則延及于血下病失治則  
槁及乎上喘咳痿厥三消噎膈之萌總由此致大凡津液結而  
爲患者必佐辛通之氣味精血竭而爲患者必藉血肉之滋填  
在表佐風藥而成功在腑以緩通爲要務古之滋燥養榮湯潤

腸丸五仁湯瓊脂膏牛羊乳汁等法各有專司也。

治燥病方十九

滋燥飲

搗治 秦芫 花粉 白芍 生地 天冬  
麥冬 加蜜童便服 人乳牛乳梨汁蔗汁時  
時可服

大補地黃丸

熱燥 熟地 當歸 杞子 山藥 山黃  
白芍 生地 元參 酒知母 酒黃柏 肉  
苳蓉 蜜丸鹽湯下

養榮湯

風燥 當歸 白芍 熟地 生地 秦芫  
黃芩 防風 甘草 黃連 黃芩 薄荷 當歸 元參  
清上部 白芍 甘草 便少加大黃

清涼飲

鎮風順氣丸

風秘 大黃 麻仁 山萸 山藥 牛膝  
枳榔 枳殼 獨活 防風 車前子 羌活  
子 郁李仁

辛潤湯

又 熟地 生地 升麻 紅花 炙甘草  
枳榔 歸身 桃仁

元戎四物湯

又 川芎 當歸 白芍 生地 煨大黃  
桃仁

加減四物湯

保肺 當歸 白芍 生地 麥冬 元參

生血潤膚飲

花柳 甘草 黃柏 五味子 天冬 一錢半 生地 熟地 麥冬 當歸 黃芪 各一錢 酒炙 桃仁 泥 瓜蔓 仁 各五分 升麻 二分 酒紅花 一分 五味 子 九粒

天門冬膏

又 天門冬 去心 生搗絞汁 濾去渣 砂鍋熬成 膏 酒服一二匙

當歸承氣湯

潤腸 當歸 大黃 各二錢 芒硝 七分 甘草 五分 水煎 臨時入芒硝 攪和服

四物湯

燥甚 川芎 當歸 白芍 熟地

生脉散

又 人參 麥冬 五味子

炙甘草湯

熱劫 炙草 阿膠 生地 麥冬 人參 麻仁

清燥救肺湯

傷氣 桔梗 黃芩 麥冬 花粉 桑皮 生地

六味丸

傷血 生地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤瀉

滋燥養榮湯

拙治 熟地 生地 黃芩 甘草 白芍 當歸 秦芪 防風

潤腸丸

又 歸尾 羌活 桃仁 麻仁 大黃 一方加秦芪 防風 皂角子

燥病源流

卷十七 四



五仁湯

瓊脂膏

又 桃仁 杏仁 柏子仁 松子仁 郁李

又 生地二十斤打汁去渣 白蜜二升煎沸  
去沫 鹿角膠 真酥油各二斤 生薑二兩  
取汁 先以慢火熬地黃汁數沸 搗取淨汁  
又煎二十沸下膠次下酥 蜜全熬至如飴 後器  
收貯 每服一二匙溫酒下

### 三消源流

沈金鰲撰

三消燥病也。三消之症分上中下。上消者舌赤裂咽如燒大渴引飲。日夜無度。中消者多食易饑。肌肉燥口乾飲水大便鞭小便如泔。下消者煩躁引飲耳輪焦便溺不攝。或使如膠油。三消之由上消肺也。由肺家寔火。或上焦熱。或心火燬煉肺金。中消脾也。由脾家寔火。或伏陽蒸胃。下消腎也。由腎陰虛。或火伏下焦。經曰心移寒于肺。爲肺消。肺消者飲一溲二。死不治。又曰心移熱于肺。傳爲鬲消。又曰奇病有消渴。皆上消也。多飲而渴不止者也。蓋肺主氣其能通調水道而有制者。賴心君火時與以溫氣而爲之主。以潤燥金。故肺之合皮。其主心也。若心火不足不能溫金。而反移以寒寒與金化。則金冷氣沉而不得升。猶下有溝瀆。上無雨露。是以飲一溲二也。是肺氣以下而枯索也。故曰肺消死不治。此因于寒者。

也。肺本燥金。心腹以熱移之。爲火燥相。卽因而鬲上焦煩。飲水多而善消。此因于熱者也。可見上消之由。有陰有陽。不可不辨。而多飲易消。火氣炎鬱。所以爲奇病也。經又曰。痺成爲消中。又曰。胃中熱則消穀。令人善饑。又曰。二陽結謂之消。皆中消也。此蓋結于本氣。陽明氣盛熱壯。然以血多津守。未嘗有所結。今言其結。則陽邪盛而傷陰。枯其津液。故結在中焦。陽明亢甚。故消穀善饑。又熱亢能消。精液不榮肌肉。故名曰消也。經又曰。溲便頻而膏濁不禁。肝腎主之。此下消也。蓋緣腎水虧損。津液枯竭。水虧火旺。蒸燖肺金。肺被火邪。又不能生腎。故成下消也。趙獻可言三消之症。總由煎熬既久。五臟燥烈。能食者必發胸疽背癰。不能食者必發中滿鼓脹。治者不必分上中下。概用清肺滋腎之藥。上消小劑。中消中劑。下消大劑。宜概用六味丸。其或命門火衰。火不歸元。遊于肺爲上

加麥冬五味子

消遊于胃爲中消。必用引火歸元之法。渴病若失矣。宜八味丸。若

過用寒涼。恐內熱未除。中寒又起。獻可此言。誠能于消病中尋源。

討流。但必切脉合症。確然審是。命門火衰。然後可用桂附。若由熱

結所致。下咽立斃矣。慎之謹之。大約善治三消者。必補腎水。真陰

之虛。瀉心火。燔灼之勢。除腸胃燥熱之邪。濟心中津液之衰。使道

路散而不結。津液生而不枯。氣血利而不澁。則消症無不愈矣。夫

三消之成。摠皆以水火不交。偏勝用事。燥熱傷陰之所致。而要之

五行之氣相成。陽勝固能消陰。陰勝亦能消陽。如經言二陽之病。

傳爲風消。二陽者。陽明也。陽明既病。木邪起而勝之。既勝。則精血

不榮。肌肉風消也。故由燥陽傷陰。而氣不化。水固爲消。由陰邪偏

勝。而陽不帥。陰其水不化。氣亦爲消。其消一也。摠治三消。宜人參

活血潤燥生津飲。又有中消而口甘者。由脾熱。中消而口苦者。由

大黃甘草飲子。

胆熱。此二種內經謂之痺症。與消病一類。而却非卽消病。蓋口甘者。脾痺。肥美之所發。肥令人內熱。甘令人中滿。中滿熱鬱其氣上溢。久亦轉爲消渴也。經則治之以蘭草。除陳氣也。蘭性味甘寒。能利水道。其清氣能生津止渴。除陳積畜熱也。口苦者。膽痺。肝取決於胆。而數謀慮不決。膽氣虛。其氣上溢。而口爲之苦。以膽之脉會于咽也。治法俱同。三消特各加引經藥。使歸于肝脾。至三消分治之方。可詳舉之。有煩渴能食者。宜人參有消渴胸滿心煩無精神者。宜人參有消渴便乾陰頭短舌白燥口唇裂眼濇而昏者。宜止寧神湯有消渴後身腫者。宜紫蘇湯有消渴面目足膝腫小便少者。宜瞿麥有消渴咽乾面赤煩躁者。宜地黃飲有消渴盛于夜者。宜加減有消渴由心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消者。宜降有心火熾熱口乾煩渴小便赤澀者。宜清心有消渴小便數舌上赤脉肌體枯瘦

者。宜和血有消渴而上焦煩熱為膈消者。宜人參有消渴不能食

者。宜麥門冬有老人虛人大渴者。宜人參以上皆上消之屬。通治上

津養血湯有消中飲食多不甚渴小便數肌肉瘦者。宜加減有消

黃芩湯穀善饑者。宜加減有能食而瘦口乾自汗便結溺數者。宜清有消

中而瘦二便秘者。宜藳香有消中由胃熱者。宜藳有消中而中焦

燥熱肌肉瘦削大便鞭小便數而黃赤者。宜生津有消中後腿漸

細將成腎消者。宜扶以上皆中消之屬。通治消中宜調胃承氣湯

順氣有腎消大渴飲水下部消瘦小便如脂液者。宜元有腎虛水

涸燥渴者。宜變有腎消大渴便數腰膝疼者。宜腎有腎消尿濁如

膏者。宜人參有腎消口燥煩渴兩腳枯瘦者。宜加減有腎虛消渴

小便無度者。宜鹿茸有腎消莖長而堅精自出者此孤陽無陰即強

中症也最難治蓋此亦由耽好女色或服丹石以恣慾久則真氣

脫而熱氣盛。故飲食如湯沃雪。肌膚削。小便如膏油。陽易興而精

易洩也。

宜六味丸。石子薺。以上皆下消之屬。

通治下消。宜補腎地黃湯。黃連。連猪肚丸。

黃元加減八味丸。

消症之不同如此。此外又有食併症。經曰。大腸移熱于胃。善食而

瘦。謂之食併。胃移熱於胆。亦名食併。註云。併者。易也。飲食移易而

過。不生肌肉也。治之。與消中同。而又有酒渴症。由平日好酒。熱積

于內。津液枯燥。煩渴引飲。專嗜冷物也。

宜烏梅木瓜湯。

而又有蟲渴症。由

蟲在臟腑之間。耗其精液。而成消渴也。

宜苦棟湯。

而又有類消症。其人

渴欲求飲。飲一二口。卽厭。不比消渴之無厭。此由中氣虛寒。寒水

泛上。逼出浮游之火。于喉舌間。故上焦欲得水救。水到中焦。以水

遇水故厭也。

宜理中湯。送八味丸。

又經云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女

子不月。陽明位太陰之表。而居中。于腑則胃當之。非若手陽明大

腸之以經絡爲陽明比也。其病發心脾者。胃與心爲生土之母。子

而脾與胃爲行津之表裡發者發足之義。人之情欲本以傷心勞  
倦憂思本以傷脾。臟既傷則必連及于腑。又必從其能連及者如  
母病必及子故凡內而傷精外而傷形者皆能病及胃。此二陽之  
病發自心脾也。然陽明爲生化之本其氣盛其精血下行化榮衛  
而潤宗筋。化源既病則陽道外衰故不行隱曲而枯澀。女子則不  
月。蓋心脾爲真陰之主。胃爲真陽之主。傷真陰必使其陽無守。二  
陽既病倉廩空而餉道絕爲生死之關。然必自真陽之傷爲之故  
曰發心脾也。治亦同三消參其症而用方主之可也。至于消渴既  
久其傳變之症在能食者必發瘧疽背瘡不能食者必至中滿鼓  
脹何也。津液竭則火邪勝故發瘧膿且痛甚而或不潰或流赤水  
也。又如上中二消制之太急寒藥多而胃氣傷故成中滿甚而水  
氣浸漬溢于皮膚則爲腫脹所謂上熱未除中寒之症復生也。夫



至瘧疽脹滿亦與強中等症皆爲傳變而不易治矣。

脉法 內經曰消渴脉寔大病久可治脉懸小堅病久不可治。

仲景曰跌陽脉數胃中有熱卽消穀引飲大便必堅小便卽數。脉經曰消渴脉當得緊寔而數反得沉澁而微者死又曰心脉滑爲渴滑者陽氣勝也心脉微小爲消痺又曰脉數大者生沉小者死。

消渴與腳氣反 本事曰消渴脚氣雖皆爲腎虛所致其爲病則相反脚氣始發于二三月盛于五六月衰于七八月消渴始發于七八月盛于十一二月衰于二三月其故何也蓋腳氣壅疾也消渴宣疾也春夏陽氣上故壅疾發則宣疾愈秋冬陽氣下故宣疾發則壅疾愈審此二者疾可理也。

消渴原由症治 本事曰消渴之症全由坎水衰少何也肺爲

五臟華蓋。若下有煖氣蒸。則肺潤。若下冷極。則陽不能升。故肺乾而渴。譬如釜中有水。以火煖之。又以板覆。則煖氣上騰。故板能潤。若無火力。則水氣不能上升。此板終不能潤。火力者腰腎強盛。常須煖補腎氣。飲食得火力。則潤上而易消。亦免乾渴之患。宜腎氣丸。又曰。消渴者。腎虛所致。每發則小便必甜。以物理推之。淋。錫。醋。酒。作脯法。須更卽甜。足明人之食後。滋味皆甜。流在膀胱。若脾腎氣盛。則上蒸炎氣。化成精氣。下入骨髓。其次爲脂膏。又其次爲血肉。其餘則爲小便。故小便色黃。血之餘也。五臟之氣。鹹潤者。則下味也。若腰腎旣虛冷。則不能蒸化穀氣。盡下爲小便。故味甘不變。其色清冷。則肌膚枯槁也。直指曰。自腎消而析之。又有五石過度之人。真氣旣盡。石勢獨留。陽道興強。不交精洩。名曰強中。消渴輕也。消中甚焉。消腎又甚焉。若強

中則斃可立待。類聚曰：五臟六腑皆有津液，熱氣在內，則津液竭少，故爲渴。夫渴者，數飲水，其人必頭目眩，背寒而嘔，皆因裡虛故也。入門曰：飲水而安者，寔熱也；飲水少頃卽吐者，火邪假渴耳。丹溪曰：三消多屬血虛，不生津液，宜以四物湯爲主。上消加人參、五味、麥冬、花粉，煎入藕汁、地黃汁、牛乳、酒客生葛根汁冲服。中消加知母、石膏、寒水石、滑石。下消加黃柏、知母、熟地、五味子。又曰：養肺降火，生血爲主。分上、中、下治之。又曰：消渴症，小便反多，如飲水一斗，小便亦一斗，宜腎氣丸。徐忠可曰：仲景云：厥陰之爲病，消渴，氣上衝心，心中疼熱，饑而不欲食，食卽吐，下之不肯止。夫厥陰之爲病，消渴七字，乃消渴之大原。然或單渴不止，或善食而渴，或渴而小便反多，後人乃有上、中、下之分，不知上、中、下雖似不同，其病原總屬厥陰。厥陰者，風木

之臟也。與風相得。故凡中風必先中肝。然風善行而數變。故在經絡在血脉在肌肉各各不同。而又有鬱于本臟者。則肝得邪而寔。因而乘其所勝。陽明受之。乘其所生。少陰受之。于是上中下或有偏勝。現症稍殊。皆為消渴。皆由厥陰風鬱火燔。故曰厥陰之為病消渴。內經亦有風消二字。消必兼風言之。亦此意也。又曰內經云。二陽結謂之消。仲景獨言厥陰似乎互異。不知邪氣浸淫病深。腸胃氣聚不散。故曰結。其使腸胃之氣不能健運而成三消。則厥陰寔為病之本。如果病專腸胃。則下之為中病。消渴宜無不止矣。然多食而飢不止為中消。此又云。饑不欲食。則知消渴之病。亦有不欲食者。但能食而渴者。全重二陽論治。飲一溲二。重在腎虛論治。其不能食而氣冲者。重在厥陰論治。此又臨症時微細之辨乎。繆仲淳曰。三消渴疾以鮎魚涎和。

黃連末爲丸每五七丸烏梅下日三服取效。又曰用白芍甘草等分爲末每一錢水煎日三服。有人患消渴九年服藥止而復作得是方服之七日頓愈。古人處方殆不可曉不可以平易而忽之。又方用瓜蒌根黃連各三兩爲末蜜丸每三十丸麥冬湯下日二服其飲水無度小便數者用田螺五升水一斗浸一夜渴卽飲之每日一換水及螺或煮食飲汁亦妙其飲水無度小便赤澀者用秋麻子仁一升水三升煮三四沸飲不過五升瘥其腎消飲水小便如膏油者用茴香苦楝子等分炒爲末每食前酒服二錢其消渴飲水骨節煩熱者用芭蕉根搗汁時飲一二合其消渴不止下元虛損者用牛膝末五兩生地汁五升浸之日晒夜浸汁盡爲度蜜丸空心酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑鬚髮津液自生其胃虛消渴者羊肚煮爛空腹服之其

消渴煩亂者。乾冬瓜瓢一兩水煎服。其消渴羸瘦小便不禁者。兔骨和大麥苗煮汁服極效。其消中易饑者。用蕤容山萸五味蜜丸每塩酒下二十九。其三消骨蒸者。以冬瓜自然汁浸晒黃連末七次。又以冬瓜汁和丸。每三四十九大麥湯下。尋常口渴。只一服見效。其強中消渴者。用猪腎一具。薺苳石膏各三兩。人參茯苓磁石知母葛根黃芩花粉甘艸各二兩。黑大豆一升水一斗半。先煮猪腎大豆取汁一斗。去渣下藥。再煮三升。分三服。名猪腎薺苳湯。後人名爲石子薺苳湯。

消痺。肝。心。腎。三經之陰虛而生內熱病也。卽經所謂熱中與三消異。靈樞經言五臟皆柔弱者。善病消痺。夫皆柔弱者。天元形體不充也。其本大氣不足。五臟氣餒。陰虛生內熱。自是內熱不解。而外消肌肉。故五臟之脉皆以微小者爲消痺。是五臟之氣不能充滿。

於榮分。而內有鬱熱以燦之也。故法以脉寔大者爲順。雖病可治。若脉懸小而堅。則精枯血槁。必不能耐久矣。是知消痺之病。本起于不足。必以滋陰平肝清熱爲主也。宜生地黃飲。子玉泉丸。

消痺症治

內經註曰。痺。謂消熱病也。多飲數溲。謂之熱中。多

食數溲。謂之消中。

內經曰。凡消痺。肥寔人則膏粱之疾也。此

人因數食甘美而多肥。故其氣上溢。轉爲消渴。註曰。食肥則腠理密。而陽氣不得外泄。故肥令人內熱。甘者性氣和緩而發散

逆。故甘令人中滿。然內熱則陽氣炎上。炎上則欲飲而嗑乾。中

滿則陽氣有餘。有餘則脾氣上溢。故轉爲消渴。入門曰。消者。

燒也。如火烹燒物者也。

熬按消爲肌肉燦。痺爲內鬱熱二字。

連讀爲一症之名。非如內經言痺成爲消中。消爲三消。痺爲痺

病也。卽內經言肥甘之病。亦消渴之類。非消痺姑附于此。

治三消方四十四

六味丸

熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤瀉

八味丸

熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤瀉 附子 肉桂

人參白朮散

人參 白朮 當歸 白芍 山梔 大黃 連翹 澤瀉 花粉 葛根 茯苓 各一錢

錢 官桂 木香 藿香 各五分 甘草 六分

寒水石 四錢 石膏 八錢 磁石 芒硝 各六錢 共為末 每取五錢 加蜜少許 服漸加至兩許 日二三服

桑白皮湯

桑白皮 新生者 二錢 茯苓 人參 麥冬 葛根 山藥 肉桂 各一錢 甘草 五分 水煎服

大甘草飲子

大黃 兩半 甘草 大者 四兩 黑豆 五升 另煮三沸 去苦水 另用井水一桶 同煮豆爛 令病人食豆飲汁 無時不三劑病去

活生津飲

天冬 麥冬 五味子 瓜蒌仁 火麻仁 生地 熟地 花粉 當歸 甘草 各一錢 水煎服



人參寧神湯

人參 生地 甘草 葛根 茯神 知母 花粉 竹葉 五味子

人參白虎湯

人參 石膏 甘草 知母

止渴潤燥湯

升麻 錢牛 杏仁 桃仁 麻仁 歸身 荆芥 知母 黃柏 石膏 各一錢 熟地 二錢 柴胡 七分 甘草 五分 川椒 細辛 各一分 紅花 二分 牛膝 熱服

紫蘇湯

紫蘇 桑皮 赤苓 各一錢 郁李仁 二錢 羚羊角 七分 牛膝 榔 七分 肉桂 木香 獨活 枳殼 各五分

瞿麥飲

瞿麥 澤瀉 滑石 各一錢 防已 一錢 牛黃 各五分 桑螵蛸 三个

地黃飲

熟地 生地 天冬 麥冬 人參 枇杷葉 枳殼 石斛 澤瀉 黃芪 甘草

加減地黃丸

熟地 山藥 山萸 丹皮 五味子 百藥煎

降心湯

花粉 二錢 人參 遠志 當歸 熟地 茯苓 蜜黃芪 五味子 甘草 各一錢 束二枚

清心蓮子飲

蓮子 二錢 赤苓 人參 黃芪 各一錢 黃芩 麥冬 車前子 地骨皮 甘草 各

七分

人參六膏湯

又

人參錢七分 甘草錢三分

石膏四錢

知母二錢三

和血益氣湯

又

酒黃柏

升麻各一錢

酒生地 酒黃

連各八分

杏仁 桃仁

石膏各六分

知

母

羌活

防已各五分

歸梢四分

生甘

草

炙甘草

麻黃根

柴胡各三分

紅花

麥門冬飲子

又

麥冬二錢

知母

花粉

人參

五味

子

葛根

茯神

生地

甘草各一錢

竹

人參麥冬湯

又

人參

茯苓

甘草

杞子

五味子

生津養血湯

通治

上消

當歸

白芍

生地

麥冬各一

錢

母

川芎

黃連各八分

花粉七分

蜜知

蓮肉

甘草

各五分

黃芩湯

又

片苓

山梔

桔梗

麥冬

當歸

生

地

花粉

葛根

人參

白芍各一錢

烏

燥 三消方

卷十七

廿三

清涼飲

中消 甘草冬用 枳 防風梢 羌活 龍胆  
草 柴胡 黃芪 茯苓 生地 酒知母  
防已 桃仁 杏仁 當歸 黃柏 石膏

蘭香飲子

又 石膏三錢 知母錢半 生甘草 防風  
各一錢 炙甘草 人參 蘭香葉 連翹  
白豆蔻 桔梗 升麻各五分 半夏二分  
蒸餅糊調成餅晒乾為末每二錢淡姜湯下  
又 石膏 龍胆草 黃柏各一錢 柴胡  
羌活 黃芪 酒知母 酒黃芩 炙甘草各  
八分 歸身六分 升麻四分 防風 防已  
生地 生甘草各三分 杏仁六分 桃仁  
五个 紅花少許 水煎加酒一匙不拘時稍  
熱服 一名清涼飲子

生津甘露湯

藕汁膏

又 藕汁 生地汁 牛乳和黃連末天花粉  
末佐以姜汁白蜜為膏挑取留舌上徐徐以白  
湯送下日三四次

加減白朮散

又 葛根二錢 人參 白朮 茯苓各一錢  
木香 知母 黃柏 甘草各五分 五味  
子九粒

茯苓丸

又 茯苓 黃連 花粉 熟地 覆盆子  
草薢 人參 元參 石斛 蛇床子 雞肫

皮磁石湯下

調胃承氣湯

加減三黃丸

又 大黃 黃芩 黃連 生地

黃連猪肚丸

又 雄猪肚全具 黃連五兩 麥冬 瓜蒌根 知母各四兩 將四味為末入肚內線封口 蒸爛搗入蜜少許丸每百丸米飲下

順氣散

又 大黃 芒硝各二錢 炙甘草一錢

元兎丸

下消 兎絲子酒浸通軟乘濕研焙乾別取末十兩 五味子酒浸別為末淨七兩 茯苓蓮肉各三兩 別研乾山藥末六兩 將所浸酒添酒打糊丸空心食前米飲下

雙補丸

又 鹿角膠 人參 茯苓 苡仁 熟地 茯苓 歸身 石斛 黃芪 木瓜 五味 兎絲子 覆盆子各一兩 沉香 澤瀉各五錢 麝香一錢

腎瀝丸

又 雞肫皮 人參 黃芪 肉桂 澤瀉 熟地 遠志 茯苓 歸身 龍骨 桑螵蛸 各一兩 麥冬 川芎各二兩 五味子 元參 炙草各五錢 磁石二兩 研碎去赤水

燥

三消方

卷十七

十四

每末五錢用羊腎煮湯代水煎日二服

加減腎氣丸

熟地二兩 丹皮 茯苓 山萸 五味  
子 澤瀉 山藥 鹿茸各一兩 肉桂 沉  
香各五錢 蜜丸空心下七八十九

人參茯苓散

滑石 寒水石各錢半 甘草七分 赤  
苓 葛根 黃芩 薄荷 大黃各五分 連  
喬三分 人參 白朮 澤瀉 桔梗 天花  
山梔 砂仁各二分 鹿茸 熟地 黃芪 五味

鹿茸丸

雞肫皮 麩炒 酒浸肉 菟蓉 破故布  
子 鹿茸 山萸 人參各七錢半 地骨皮  
酒牛膝 元參各五錢 蜜丸空心米飲下

石子薺苳湯

薺苳 石膏各錢半 人參 茯苓 花  
粉 磁石 知母 葛根 黃芩 甘草各一  
錢 先以水三盞煮猪腰一個黑豆一合至半

補腎地黃丸

去渣入藥煎七分食後服次服黃連猪肚丸  
通治下消 黃柏一斤切 生地半斤酒浸二  
日蒸爛研膏與黃柏拌曬乾 茯苓四兩 天  
冬 熟地 人參 甘菊各二兩 酒條芩  
生片芩 當歸 枳壳 麥冬各一兩 水丸  
空心鹽酒下七八十九

加減八味元

熟地二兩 山藥 山萸各一兩 酒蒸  
澤瀉 扶苓 丹皮各八錢 五味子各一兩

兩半 肉桂五錢 蜜丸五更初未言語時服

湯下五六十九臨臥再服 此方有五味最爲

得力不惟止渴亦免生瘡疽久服永除渴疾氣

血加壯 烏梅打碎 木瓜各二錢 炒麥芽

酒湯 甘草各一錢 姜三片 麝香少許 水

煎空 心飲之 苦楝根皮一握切 磨香少許 水

苦楝湯 熟地 山藥 山萸 丹皮 扶苓

金匱腎氣丸 補氣 熟地 山藥 山萸 丹皮 扶苓

四物湯 補血 川芎 當歸 白芍 地黃

治消痺諸藥要品及方二

滋陰清熱平肝 地黃 元參 麥冬 龍中 沙參 山藥

續斷 青蒿 牛膝 五味 山萸 阿膠

珠 沙蒺藜 柏子仁 地骨皮 杞子

金石斛 車前子

玉泉丸 消痲 花粉 葛根各兩半 麥冬 人參

三消方 茯苓 烏梅 甘草各一兩 生黃芪

蜜黃芪各五錢 蜜九彈子大每一丸溫水嚼

生地黃飲子

又下 人參 黃芪 生地 熟地 金石斛  
天冬 麥冬 枳壳 枇杷葉 澤瀉各一錢

甘草五分  
此方乃二黃元合甘露飲也生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳壳疏導二府使心火下行則小便清利肺金潤澤火府流暢宿熱既消其渴自止造化精深妙無倫比

火病源流

沈金鰲撰

火有三。一曰君火。一曰相火。一曰龍雷之火。入之心爲君。以照臨爲德。故居神之物。惟火爲之。所謂君火也。君火不以火用。惟建極于廣明。廣明卽臚中爲神明喜樂之官。廣大清明之地。君主居之以照臨十二官。爲生之本。榮之居。初非以燔灼爲令也。經故曰。君火以明。以明者。言照臨之不爽也。後人昧乎明字之義。因改曰。君火以名。亦可發一笑矣。然君火雖不用。有時無精以養。則神空飛。而有自焚之患。則亦有灼熱之時。相火者。心包代君行事。在三焦之中。處兩陽合明之地。所以應天之夏令。而主乎腐熟水穀。故經曰。陽明者。午也。經以陽明當相火。夏令不言心包。而心包在其中矣。蓋人之相火。起少陽胆。游行三焦。督署于心包。爲陽明胃腐熟水穀之主。故曰。少陽相火。火之能相。在小陽耳。丹溪諸公。乃以龍



雷之陰火爲相火。後人多承襲其說。其不知相火先不知龍雷之陰火矣。所謂龍雷者。何。墨氏曰。性火真空。性空真火。遍滿法界。陰符曰。火生于木。禍發必尅。蓋陽隨真形。卽在陰物莫宅之中。故此火則隱。胎坎水。眊兆風。木寔在乎君相有形之外。是謂龍雷。無故則不現。雖激之亦不起。惟水涸木枯。氣逆血沸。則勢將焚巢燎原。而不可止。此火若起。則反君滅相。豈君相治平之火乎。緣此火不起于子半。不循行于少陽胆。猝犯之而猝起。所謂火生于木。禍發必尅者也。何前人竟謂之相火哉。然而相火之爲害亦大矣。甚則爲元氣之賊。又能煎熬真陰。陰虛則病。陰絕則死。皆相火之爲也。夫火主動。凡動皆屬火。醉飽胃火動。恚怒肝火動。悲哀肺火動。房勞腎火動。心火能自焚。是五臟又皆有火也。且火動卽身熱。其困于五臟者各不同。如按至脾肉之下。至骨上。乃肝之熱。寅卯時尤

甚其症必兼四肢滿悶。便難轉筋。多怒多驚。筋疲不能起于牀。宜  
胡飲。如按至皮膚之下。肌肉之上。輕手乃得。微按至皮毛之下。則  
熱少。加力按之。則全不熱。是熱在血脉也。乃心之熱。日中尤甚。其  
症必兼煩心。心痛。掌中熱而腕。宜導赤湯如輕手按不熱。重按至筋骨  
亦不熱。在不輕不重間。此熱在肌肉也。乃脾之熱。夜尤重。其症必  
兼怠惰嗜卧。四肢不收。無氣以動。宜分虛寔湯宜分虛寔。虛宜補中益氣湯實宜瀉黃散如輕  
按不熱。重按至骨。其熱炙手。乃腎之熱。亥子時尤甚。其症必兼骨  
蘇蘇然如虫蝕。其骨因熱不任。亦不能起于牀。宜滋腎丸如輕手乃得。  
略按全無。此熱在皮毛也。乃肺之熱。日西尤甚。宜分輕重。輕者瀉白散重者  
首涼是五臟之熱所宜審也。且火動則熱壅。其見于三焦者。又各  
不同。如熱在上焦。因欬而為肺萎。或口舌生瘡。眼目赤腫。頭項腫  
痛。宜涼膈散清心湯。如熱在中焦。大便堅結。或胸膈煩躁。飲食不美。

宜四順清涼飲

桃仁承氣湯

如熱在下焦。尿血淋閉。或小便赤滴。大便秘結。立

效。散防風

當歸飲子。是三焦之熱。所以審也。然而火之虛寔。又宜辨。如遇發

熱。脉沉寔而大者。爲寔。浮而虛數者。爲虛也。火之燥濕。又宜辨。燥

火疼而不腫。濕火腫而不疼。又燥火筋縮而疼。濕火腫脹而疼。又

燥火口渴便閉。濕火口不渴而大便滑也。痰與火。又宜辨。如病之

有形者。總是痰。紅腫結核。或疼或不疼。是也。病之無形者。總是火。

但疼不腫。是也。火變病。又宜辨。如睡覺忽腰背重滯。轉側不便。如

隆冬薄衣不冷。非閑壯盛。如平時筋不縮。偶直足一曲。卽縮。如食

時有涕無痰。不食時有痰無涕。如弱症左側睡。心左墜。一響。右側

睡。心右墜。一響。如心中滴滴噹噹。若有響聲。如頭眩耳鳴。目暈。皆

火之變。習也。治火之藥。又宜辨。如心火。宜黃連。連生地。小腸火。宜赤

通肝火。宜柴胡。胆火。宜連翹。脾火。宜白芍。胃火。宜石膏。葛。肺火。宜

黃芩

龍胆草

生地

芍藥

石膏

葛根

黃芩

柴胡

連翹

白芍

赤芍

槐黃芩桑大腸火宜大黃腎火宜黃柏膀胱火宜黃柏三焦火宜

皮石膏山槐中宜連喬心包絡火宜麥冬燥火宜生地當濕火宜蒼朮木

下宜地骨皮冬寔火宜大黃寔火熱甚宜黃連黃柏黃芩山梔虛火宜姜皮竹

便甘草生姜虛火宜補宜人參黃芪白腎火宜青腎火重按烙手輕按

不覺此熱在肌肉之內取汗則愈宜升麻葛根羌活以發熱腎之

利小便而血中火宜生血虛發熱宜當歸生氣如火從足下起入

腹為虛熱之極十不救一宜六味加肉桂大劑作湯外用無根之

火遊行作熱宜元參腎水受傷為真陰失守宜六味加元痰結熱

火宜竹茹竹瀝過食生冷遏抑少陽之火于脾部宜加減是皆火

之為病所當悉心究之者火之見症又宜辨二便忽閉火也以利

小便為先宜赤苓猪苓澤瀉通草車前子氣逆冲上火也以降氣

清熱為先宜櫛金蘇子躁擾狂越詈罵驚駭火也以清鎮涼解為

先。宜牛黃黃連黃芩山梔滑石知母童便石膏大便秘加大黃不行再加芒硝。猝眩仆。九竅流血。火也。

以降折清涼為先。然多不治。宜犀角汁童便竹瀝以

涼心解毒為先。宜山梔白芍生甘草目暴赤腫痛甚。火也。以涼血

清熱為先。宜生地赤芍黃柏荆芥山梔木通頭面忽然赤腫或痛。

火也。以清熱消毒為先。宜甘草牛蒡子連翹荆芥石膏竹口乾舌

苦忽大渴思水。水。火也。以清潤生津為先。宜石膏知母元參麥冬

蔗汁暴瘡。火也。以降氣發音為先。宜蘇子貝母桔梗百部竹瀝天

童便暴注。火也。以利水洩熱為先。宜茯苓黃連黃芩滑石禁探如喪

神守。火也。以清熱鎮神為先。宜硃砂黃芩山梔知母癰瘡。昏亂。火

也。以和肝滌熱為先。宜白芍竹葉元參黃連石膏症狀不同而各

有所以治之。如此總之治火。切不可久任寒涼之品。重傷脾胃。便

不可救。故化而裁之。因乎變神而明之。存乎人。

脉法一脉經曰火脉洪數虛則浮 脉訣曰骨痿勞熱脉數而虛熱而澁小必損其軀加汗加咳非藥可治 丹溪曰脉寔熱者有寔熱 正傳曰脉浮而洪數虛火沉而寔大寔火洪數見左寸心火右寸肺火左關肝火右關脾火兩尺腎經命門之火男子兩尺洪大必遺精陰火盛也

火論四條 繆仲淳曰夫火者陽也氣也與水爲對待者也水爲陰精火爲陽氣二物匹配名曰陰陽和平亦名少火生氣如是則諸病不作矣倘不善攝養以致陰虧水涸則火偏勝陰不足則陽必湊之是謂陽盛陰虛亦曰旺火食氣是知火卽氣也氣卽火也東垣亦曰火與元氣不兩立亦指此也譬諸水性本流過極卽疑爲冰解則復常非二物也蓋平則爲水火旣濟火卽真陽之氣及其偏則卽陽氣而爲火也始與元氣不兩立矣

故戴人曰。莫治風。莫治燥。治得火時。風便了。正指火之變態多端。爲病不一。了此。則皆可辦也。人身之有陰陽。水一而已。火則二焉。是稟受之始。陽常有餘。陰常不足也。故自少至老。所生疾病。由于真陰不足者。恒也。若真陽不足之病。千百中一二矣。陽者。氣也。火也。神也。陰者。血也。水也。精也。陰陽和平。是爲常候。若縱恣房室。或肆情喜怒。或輕犯陰陽。或嗜好辛熱。以致腎水真陰不足。不能匹配陽火。遂使陽氣有餘。氣有餘。卽是火。故火愈盛。而水愈涸。于是而吐血。咳嗽。吐痰。內熱。骨蒸。盜汗。種種陰虛之病。醫者又不明。比見前症。不分陰陽。概施溫補。參茸二木。還佐姜桂。倘遇僥劇。輒投附子。死猶不悟。良可憫也。雖然。亦病家不明。有以致之。何則。難成易虧者。陰也。益陰之藥。必無旦夕之效。助陽之藥。能使胃氣一時暫壯。飲食加增。或陽道興舉。有

似神旺醫者病者。利其速效。宜乎服藥者多斃。勿藥者反得存也。人身以陰陽兩稱爲平。偏勝則病。此大較也。水不足則火有餘。陰旣虧。則陽獨盛。蓋陰陽之精互藏其宅。是陽中有陰。陰中有陽也。故心火也而生赤液。腎水也而藏白氣。赤液爲陰。白氣爲陽。循環不息。此常度也。苟不知攝養。虧損真陰。陽無所附而發越上升。此火空則發。周身之氣併于陽也。併于陽則陽盛。故上焦熱而咳嗽生痰。迫血上行而爲吐衄。爲煩躁。爲頭痛。爲不得眠。爲胸前骨痛。爲口乾舌苦。此其候也。陽愈盛則陰虛。陰愈虛則爲五心煩熱。爲潮熱骨蒸。爲遺精。爲骨乏少力。爲小水短赤。丹田不煖。則飲食不化。爲瀉泄。爲卒僵仆。此其候也。治之之要。當亟降氣。當急益精。氣降則陽交于陰。是火下降也。精血生則腎陰來復。是水上升也。此坎離而旣濟也。至此則陰陽二



氣復得其平矣。經曰：形不足，補之以氣。人參、黃芪、人胞、羊肉、紅鉛之屬，是已益陽氣也。乃可以却沉寒。經曰：精不足，補之以味。人乳、鼈甲、地黃、黃柏、杞子、牛膝、天冬之屬，是已補陰精也。乃可以除伏熱。

火病原由症治。內經曰：心熱病者，顏先赤，頰即頤也。脾熱病

者，鼻先赤。肝熱病者，左頰先赤。肺熱病者，右頰先赤。腎熱病者，

頤先赤。綱目曰：心肺居胸背，心熱則胸熱，肺熱則背熱。肝膽

居脇，肝胆熱則當脇熱。腎居腰，腎熱則當腰熱。胃居臍上，胃熱

臍以上熱。腸居臍下，腸熱則臍以下熱。以上言臟腑發熱部分東垣曰：

凡病，晝病在氣，夜病在血。晝發少而夜發多者，足太陽膀胱血

中浮熱，微有氣也。有時發，有時止，知邪氣不在表，不在裡，而在

經絡中也。夜發多者，是邪氣下陷之深，當從熱入血室而論之。

宜瀉血湯退熱湯。海藏曰：晝熱則行陽二十五度，宜柴胡飲。

子夜熱則行陰二十五度，宜四順清涼飲。平旦發熱熱在行陽

之分，肺氣主之，故宜白虎湯以瀉氣中之火。日晡潮熱熱在行

陰之分，腎氣主之，故宜地骨皮散以瀉血中之火。入門曰：氣

分寔熱，白虎湯；血分寔熱，四順清涼飲。氣分虛熱，清心蓮子飲。

血分虛熱，滋陰降火湯。

以上言晝夜發熱之異

丹溪曰：火能消物，凡燥

金虧土旺，木涸水者，皆火也。河間曰：火之爲病，其害甚大，其

變甚速，其勢甚張，其死甚暴。人身有二火，一君火，一相火，在氣

交中，多動少靜。凡動皆屬火，化動之極也。病則死矣。又有臟腑

陰陽之火，根於五志之內，六慾七情激之，其火隨起。東垣曰：

相火易起，五性厥陽之火相扇，則妄動矣。火起于妄，變化不測。

無時不有，煎熬真陰，陰虛則病，陰絕則死。又曰：火者，元氣穀氣

真氣之賊也。

以上言火為元氣賊

丹溪曰。病人自言冷氣從下而上。非

真冷氣也。此上升之氣自肝而出。中挾相火自下而上。其熱為

甚。自覺其冷者。火極似水。積熱之甚也。陽亢陰微。故見此症。冷

生氣者。高陽生之謬言也。又曰。氣從左邊起。肝火也。宜回金丸

氣從臍下起。陰火也。宜黃柏丸。坎離丸。氣從足下起。入腹。乃虛

之極也。宜滋陰降火湯。外用津調附子末塗湧泉穴。引熱下行。

蓋火起于九泉之下。十不救一。

以上言上升之氣屬火

東垣曰。能食而

熱。口舌乾燥。大便難者。寔熱也。以辛苦大寒之劑下之。瀉熱補

陰。脈洪盛而有力者。是也。不能食而熱。自汗氣短者。虛熱也。以

甘寒之劑瀉熱補氣。脈虛而無力者。是也。

海藏曰。五臟陰也。

所主皆有形。骨血筋血皮毛是也。此五臟皆陰。足陰足而熱。反

勝之。是為寔熱。若骨痿肉燥。筋緩血枯。皮聚毛落者。陰不足。陰

不足而有熱。乃虛也。丹溪曰。寔火可瀉。黃連解毒湯之類。

虛火可補。四君子湯之類。以上言火。熱有虛寔。內經曰。陰虛則發熱。陽

在外爲陰之衛。陰在內爲陽之守。精神外馳。嗜慾無節。陰氣耗

散。陽無所附。遂致浮散于肌表之間。而惡熱。當作陰虛治之。又

曰。惡寒。戰慄。皆屬于熱。又曰。病熱而反覺自冷。寔非寒也。古人

遇戰寒之症。有以大承氣湯下燥糞而愈者。明是熱症耳。丹

溪曰。惡熱非熱。明是虛症。惡寒非寒。明是寔症。仲景曰。其人

亡血。必惡寒。後乃發熱。無休止。其陰脉必遲。瀉或微瀉。以上言

寒。陽虛外寒。陽盛外熱者。內經曰。陽受氣于上焦。以溫皮膚

分肉之間。今寒氣在外。則上焦不通。上焦不通。則寒氣獨留于

外。故寒慄。又曰。上焦不通利。則皮膚密。腠理閉。寒。元府不通。

衛氣不得洩越。故外熱。陰虛內寔。陰盛外寒者。內經曰。有所勞

倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胸中故內熱又曰厥氣上逆寒氣積于胸中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留而血凝澁澁則脉不通其脉盛大以澁故中寒以上言陰陽虛盛而致內外寒熱方廣曰陰虛陽虛丹溪辨之明矣何則日夜發

熱日重夜輕口中無味陽虛症也午後發熱夜半則止口中有味陰虛症也陽虛之症責在胃陰虛之症責在腎蓋飢飽傷胃則陽虛矣房勞傷腎則陰虛矣以藥論之甘溫則能補陽氣苦寒則能補陰血如四君子補陽氣四物補陰血是也若氣血兩虛但以甘溫補氣氣旺則能生血也若只血虛而氣不虛亦用甘溫補氣氣旺而陰血愈作矣故陽虛與陰虛甘藥與苦藥不可不慎也入門曰氣虛熱升陽以散之宜補中益氣湯益胃升陽湯血虛熱滋陰以降之宜滋陰降火湯坎離丸氣血俱虛

熱升。陽。滋。陰。兼。用。之。宜。十。全。大。補。湯。八。參。養。榮。湯。加。知。母。黃。柏。

以上辨陰虛陽虛

丹溪曰。飲酒人發熱者難治。不飲酒人因酒發熱

者。亦難治也。仲景曰。飲酒發熱。黃連解毒湯加葛根主之。上

言飲酒發熱

直指曰。其人血滯而發熱者。脈澀。必有嗽水之症。必

有嘔惡之症。必有兩足厥冷之症。必有小腹結急之症。或吐血

或鼻衄。宜用柴芩佐以川芎白芷桃仁五靈脂更加大黃蜂蜜

使滯血宜通。黑物利去。則熱不復作矣。

以上言滯血發熱

入門曰。火

不妄動。動由于心。靜之一字。其心中之水平。又曰。神靜則心火

自降。慾斷則腎水自升。

以上言制火有方

丹溪曰。退熱之法。全在清

心。必用麥冬燈心白朮茯苓。益心者。一身之宰。心不清。則妄動

而熱不退。熱能傷血。血滯則氣鬱。而熱愈不退。退熱之法。又在

調血。宜用芎歸。若陽浮于外。則當歛以降之。宜參苓白朮散。

直指曰凡壯熱煩躁用柴芩大黃解利之其熱不退宜用黃芩

川芎烏梅作劑入黃連生地赤苓燈艸煎湯其效甚速蓋芎地

皆能調血心血一調其熱自退駱隆古曰風火既熾當滋腎

水可耳以上言退熱有法海藏曰君火者心火也可以濕伏可以水

滅黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水滅惟從其性

而伏之黃柏之屬可以降之又曰上焦熱梔子片芩中焦熱黃

連白芍下焦熱黃柏大黃東垣曰黃連瀉心火黃芩瀉肺火

白芍瀉脾火柴胡瀉肝火黃連佐之知母瀉腎火木通瀉小腸

火條芩瀉大腸火柴胡瀉胆火黃連佐之鰲按瀉胆火龍胆草爲最石膏瀉

胃火黃柏瀉膀胱火入門曰主治各經熱藥肝之氣柴胡血

黃芩心之氣麥冬血黃連脾之氣白芍血大黃肺之氣石膏血

梔子腎之氣元參血黃柏胆之氣連翹血柴胡胃之氣葛根血

大黃。大腸之氣。連喬。血大黃。小腸之氣。赤苓。血木通。膀胱之氣。滑石。血黃柏。心包之氣。麥冬。血丹皮。三焦之氣。連喬。血地骨皮。  
以上言臟腑

瀉火清熱藥

丹溪曰。除熱瀉火。非甘寒不可。有大熱脈洪大。

服苦寒劑而不退者。加石膏。火妄動。夏月用益元散鎮墜之。虛熱用荊芥薄荷山梔黃芩。是熱用大黃芒硝。是火可瀉。黃連解毒湯之類。虛火可補。參朮甘草之類。火盛者不可驟用寒涼。必兼溫散。火急甚者必緩之。生甘草煎瀉兼緩。參朮亦可。火盛發狂人壯氣寔者。可用正治。冰水之類。飲之。虛者用生姜湯。若投冰水立死。補陰則火自降。黃柏生地之類。又曰。芩連白芍知母柴胡皆苦寒。能瀉五臟有餘之火。若內傷勞倦爲陽虛之病。以甘溫除之。如參芪甘草之屬。相火熾盛日漸煎熬爲血虛之病。以甘寒降之。如歸地之屬。心火亢極爲陽強之病。以鹹冷折之。



如硝黃之屬。腎水受傷。真陰失守。為陰虛之病。以壯水之主。制之。如生地。元參之屬。命門火衰。為陽脫之病。以溫熱濟之。如附桂之屬。胃虛食冷。遏抑陽氣。為火鬱之病。以升散發之。如升麻。葛根之屬。以上言通治。火熱之藥。

治火病方四十方

六味丸 虛熱 澤瀉 熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓

加減發鬱湯 火遏 香附 升麻 葛根 羌活 柴胡 細辛

瀉血湯 夜熱 丹參 酒生地 柴胡各一錢 熟地 蒲黃

各七分 桃仁 泥二分

退熱湯 又 黃芪 錢三分 柴胡一錢 酒黃連 黃芩 甘草 赤芍 地骨皮 生地 蒼朮 各七分 歸身 升麻 各五分

柴胡飲子 晝熱 大黃 柴胡 黃芩 人參 當歸 赤芍 甘草 各一錢 姜三片

四順清涼飲

積熱二分

蒸大黃 薄荷汁

赤芍

當歸

炙草各一錢

白虎湯

朝熱

石膏

知母

甘草

粳米

地骨皮散

骨蒸

石膏二錢

柴胡

黃芩

知母

生

地各一錢 羌活 麻黃各七分半

姜三片

清心蓮子飲

心火 錢

蓮子二錢

赤苓

人參

黃芪各一

甘草

滋陰降火湯

血熱 麥冬

白芍錢三分

當歸錢二分

熟地

陳皮七

鹽知母 鹽黃柏 炙草各五分

薑三

黃連解毒湯

虛火

黃連

黃芩

黃柏

山梔

各錢二分

四君子湯

虛火

人參

茯苓

白芍

甘草

宗膈散

積熱

連翹二錢

大黃

芒硝

甘草各一

錢

錢 薄荷 蜜少許

黃芩

山梔

各五分

竹葉七片

清心湯

上焦熱 甘草錢七分 連喬 山梔 酒蒸  
大黃 薄荷 黃連 黃芩各七分 朴硝五  
分 竹葉七片 蜜少許

加減涼膈散

又 連喬二錢 甘草錢半 山梔 黃芩  
桔梗 薄荷各五分 竹葉七片  
中焦熱 桃仁 大黃 芒硝 甘草 桂枝

桃仁承氣湯

立效散

一 薑 燈心 瞿麥四錢 山梔二錢 甘草一錢

防風當歸飲子

一 滑石三錢 柴胡 人參 赤苓 甘草  
各一錢 大黃 當歸 赤芍 防風各七分

五蒸湯

此方乃專治風熱燥熱濕熱補虛之妙劑  
諸蒸 石膏二錢 生地 葛根各錢半 知  
母 黃芩 赤苓各一錢 甘草五分 竹葉  
七片 梗米一撮 小麥二撮

五蒸丸

又 青蒿童便浸 地骨皮 生地 石膏  
各一兩 當歸七錢 胡黃連五錢 醋鹽甲  
一片 蜜丸小麥湯下七十九

荊蓬煎丸

骨蒸 三稜 蓬朮俱酒浸三日夏一日全巴  
豆二十八粒炒去豆湯浸去白各二兩 木香

清骨散

枳殼 青皮 茴香 檳榔各一兩 糊丸  
姜湯下三五十九  
又生地 柴胡各二錢 熟地 人參 防  
風各一錢 薄荷七分 胡黃連 秦艽 赤  
苓各五分

柴前梅連散

又柴胡 前胡 烏梅 黃連各一錢 童  
尿二盞 猪胆一个 猪脊髓一條 韭白五  
分 煎至一盞服

加小柴胡湯

此切劑也胃虛人忌用  
付五心熱 柴胡 黃芩 人參 甘草 加香  
減黃連 前胡

升陽散火湯

升麻 葛根 羌活 獨活 人參 白  
芍 各一錢 柴胡 甘草各七分 防風五分  
甘艸三分

火鬱湯

又羌活 升麻 葛根 白芍 人參 銀  
胡 甘草各一錢 防風五分 葱白  
半夏曲 茯苓 蘇葉 厚朴 姜

四七湯

大棗

補中益氣湯

潮熱 黃芪錢半 人參 白朮 炙草各一  
錢 歸身 陳皮各五分 升麻 柴胡各三  
分

茯苓補心湯

勞心 白芍二錢 熟地錢半 當歸一錢二

加減逍遙散

分 陳皮 枳壳 葛根 桔梗 蘇葉 甘草

四物二連湯

草 當歸 白芍 柴胡 茯苓 白朮 甘草

參蘇飲

皮 黃芩 秦艽 木通 車前子 等分入

三黃元

水 下三十五九 黃連 等分 蜜丸

洗心散

甘草 各一錢 白朮五分 薄荷七葉 赤芍

回金丸

肝火 黃連六兩 吳茱一兩 蒸餅九空心

黃柏丸

下三十五九 黃柏一味 為末 水丸 空心服

坎離既濟丸

又酒當歸二兩 熟地 酒生地 山萸  
酒牛膝 天冬 麥冬各四兩 酒白芍 五  
味子 山藥 酥炙龜板各三兩 酒知母  
鹽知母各二兩 酒川柏 鹽川柏各三兩  
川芎一兩 蜜丸 鹽湯下三五十丸

四物湯

陰虛血 川芎 當歸 白芍 地黃

益胃升陽湯

內傷 白朮一錢半 人參 神曲各七分五  
厘 黃芪一錢 歸身 陳皮 炙甘草各五  
分 升麻 柴胡各三分 黃芩二分

十全大補湯

升陽 人參 白朮 茯苓 甘草 川  
芎 當歸 白芍 地黃 黃芪 肉桂各一  
錢 姜三 棗二

人參養榮湯

又酒白芍二錢 人參 當歸 黃芪 白  
朮 陳皮 肉桂 炙草各一錢 五味子  
熟地 防風各七分半 遠志五分 姜三  
棗二

橘皮湯

虛損 橘皮三錢 竹茹 甘草各一錢 人  
參五分 姜三 棗二

人參竹葉湯

又石膏 麥冬各二錢 半夏一錢 炙甘  
草 人參各五分 竹葉七片 粳米一撮

火病方

姜三片

淡竹茹湯

又 麥冬 小麥各二錢 半夏錢半 白茯苓 人參各一錢 甘草五分 竹茹一錢二分 姜三 棗二

既濟湯

又 人參 麥冬 半夏 甘草 生薑 梗米 附子 此即竹葉石膏湯去石膏加附子

竹葉石膏湯

又 甘草 生薑 梗米 竹葉 石膏 人參 麥冬 半夏 生

陰生內熱湯

又 川芎 當歸 蒼朮 陳皮各八分 白芍 沙參各七分 白芍 山梔 花

粉各六分 元參五分 黃柏三分 甘草二分 分 姜三片 久服去川芎冬月加補骨脂

諸血源流 蓄血症脫血症

沈金鰲撰

諸血。火病也。血生於脾。統于心。藏于肝。宣布于肺。根于腎。灌溉於一身。以入于脉。故曰血者神氣也。其入于脉。少則瀆。充則是。生化旺。諸經賴以長養。衰耗竭。百脉由此空虚。蓋血屬陰。難成而易虧。人非節慾以謹養之。必至陽火盛熾。日漸煎熬。真陰內損。而吐衄妄行于上。便溺滲洩于下。精神損而百病生矣。故經曰。心主血而不能藏。夜則復歸于肝。肝藏血而不能主。晝則聽令于心。心爲君。肝爲相。君火動。相火從之。相火動。六經之火從之。火動則血隨以動。迨至六經受傷。血液流迸。聚于兩脇。胸膈之間。從火而升。爲吐爲咯。傷重者。從夾脊而上。如潮湧生。法當任其出。不得強遏。以所出皆敗血。卽遏之亦不歸經也。必與以消瘀之品。佐以潤下之劑。使敗血下行。乃服止血藥以歸其經。再服補血藥以還其元。此正



治也。試舉諸血症詳言之。吐血者。吐出全血也。陽症血色鮮紅。陰

症血色如猪肝紫黯。或由七情妄動。形體疲勞。陽火相迫。錯行。肺

洪口渴便結者。須用涼藥。宜二冬二母生地丹皮若氣虛挾寒。陰

陽不相為守。血亦妄行。必有虛冷之狀。蓋陽虛陰必走也。宜理中

香烏血症久古人多以胃藥收功。如烏藥沉香炮姜大棗。此虛家

神劑也。而其條分縷判。則有傷酒食醉飽。低頭掬損肺臟。吐血汗

血。或口鼻妄行。但聲未失者。宜花散有勞瘵而吐血者。宜神膏有勞心

而吐血者。宜米有肺痿而吐血者。宜黃明有陽虛而吐血者。宜生

膏。有憂志吐血。煩滿少氣。胸中疼痛者。宜柏有氣鬱而吐血者。宜香

散。有心熱而吐血者。宜黃湯有吐痰夾血。心煩骨蒸者。宜人中有降

跌瘀血。積在胸腹。吐血無數者。宜乾藕有忽然吐血一二口。或心

衄。或內崩者。宜阿膠湯皆當治。而古人試血之法。又不可不知。如

吐在水盃內。浮者肺血也。沉者肝血也。半浮半沉者心血也。各隨所見。以羊肺羊肝羊心者。熟蕪白芨末。日日食之。咯血者。痰中咯出血。疙瘡。與吐血症相類。輕則身涼脉微。重則身熱脉大。急則治標。宜十灰散。花蕊散。緩則治本。宜四物湯。犀角地黃湯。當斟酌行之。而其條分縷判。則有由肺熱者。宜青餅子。有由肺損者。宜薏苡仁散。皆當治咳血者。火乘金位。肺絡受傷。故血從咳嗽出也。先痰嗽而後見紅者。是積痰生熱。宜急降痰火。宜橘紅蘇子貝母。麥冬黃連瓜蒌霜。先見紅而後痰嗽者。是陰虛火動。痰不下降。宜滋陰降火。宜補陰丸。加麥冬。而其條分縷判。則有肺家熱鬱。而咳血者。宜紫苑丸。有咳血而極甚不止者。宜桑白皮散。有肺破而嗽血不止者。宜海犀膏散。皆當治。而此條又當與咳嗽條互參。衄血者。勞傷元氣。陰虛火動。邪火上冲。氣歸于肺也。宜清肺降火。宜白虎湯。加地黃犀角丹皮白芍山梔。而其條分縷判。則有由肺經寔熱者。宜青黃散。有由少小鼻破。

衄血小勞輒出者。

宜桑耳塞鼻丹

有由病後常衄小勞卽作者。

宜石膏杜蟬丸

有

衄至五七日不住者。

宜人中白散

有口鼻出血如湧因酒色大過者。

宜荆

芥

散有火熱上升而衄極甚或不止者。

宜沈氏正衄丹

牙血者陽明經熱火

上攻所致或挾風或挾濕或係血熱或係氣寔。

宜清胃湯加減

或大寒犯

腦。

宜白芷散須就脉症辨之。

總治宜用百草霜擦牙立止

舌上無故出血者全屬心

火舌爲心苦也。

宜槐花末擦之

而其條分縷判則有舌硬而出血者。宜木賊煎

有舌腫出血如泉者。

宜塗舌丹

有舌上出血竅如針孔者。

宜紫金湯

血

者一因膀胱火卽血淋之屬。

宜淋瀝

溺出必痛。

宜小蘗飲子

或四物

一巴

下元虛冷卽尿血溺出不痛。

宜金匱腎氣丸

而其條分縷判則有由勞傷

者。

宜茅根湯

有由陰虛者。

宜參芪薤芎散

有卒然尿血不止者。

宜龍胆草湯

有不問

男婦患溺血者。

宜龍骨散

皆當治。

腸風者。

腸胃間濕熱鬱積甚

至脹滿而下血也。

宜加阿膠

花散或四物湯

槐山槐地榆

而其條分縷判則有風入

大腸留滯不散。挾濕而成者。宜加減。有陰分虛。血不循經而成者。

宜四物湯。地榆散合用。皆當治。便血者。內經謂之結陰。病由于陰。氣內結。不

得外行。血無所稟。滲入腸間。遂成此症。與腸風不同。內經釋云。其

脉必虛澁者是也。宜平胃地榆湯。結陰丹。清臟湯。榆砂湯。而其條分縷判。有先便後

血。仲景謂之遠血者。宜黃土湯。有先血後便。仲景謂之近血者。宜赤小豆當歸

散。有內傷下血。必有以解脉絡之結者。宜連芫。有寔熱積于內而便

血者。宜當歸承氣湯。有結陰下血。而腹痛不已者。宜地榆甘草湯。有由脾濕便血

者。宜蒼朮地榆湯。有大便瀉血。三代相傳者。宜砂仁末米湯。熱有臟毒下

血者。宜大蘇丸。旱蓮草散。乾柿散。有痔漏脫肛。瀉血面色萎黃。積年不瘥者。宜

木有五腫。腸風痔漏。瀉血。糞前有血。名外痔。糞後有血。名內痔。大

腸不收。名脫肛。穀道四面弩肉如奶。名舉痔。頭上有孔。名瘻瘡。內

有虫。名虫痔者。宜槐角丸。有瘀血內漏者。宜蒲黃散。有下血虛寒。日久腸

冷者。

宜熟附子丸

有便血及腸風。用寒藥熱藥及脾虛藥。俱不效者。

宜山

散。

有便血止後。但覺丹田元氣虛乏。腰膝沉重。少力者。

宜桑寄生散

有卒瀉鮮血。噴出如竹筒者。

宜小蘗打汁。溫服一升。

有腸胃積熱。及因酒毒。

下血。腹痛作渴。脉弦數者。

宜黃連丸。酒蒸黃連丸。

有大腸素虛。挾風。又飲酒。

過度。挾熱。下痢膿血。且痛甚。多日不瘥者。

宜烏梅丸。栲白皮散。

有風邪入臟。

或食毒積熱。大便鮮血。疼痛肛出。或久患酒痢者。

宜木饅頭散。

皆當治。

痰涎血者。脾家畜熱所致。

宜加味逍遙散。清肺湯。

而痰唾中帶有紅絲紅點。

病尤為甚。其條分縷判。則有由六經之火者。

宜山梔子黃湯。

有由思慮傷。

心傷肺者。

宜天門冬湯。

有由于陰分虛弱者。

宜清人滋陰湯。

嘔血者。血從口湧。

出。多至成盆。成碗者。始必大怒。以至肝氣上逆。治以降氣清熱為

主。宜蘇子。降金橘皮。甘草。梔子。香蒲。黃芩。當歸。

而其條分縷判。則有飲

酒過多。積熱湧盛。或至垂死者。

宜葛花黃丸。

有飲食過度。負重弩力。傷胃。

而大嘔者。

宜是齋白朮散

有陽乘于陰血溢妄出者。

宜四生丸

有內傷心肺血

如涌泉從口鼻出。須臾不救則死者。

宜側柏散

有血出如泉。諸藥不能

效者。

宜七生湯

有因虛勞五內崩損。涌出可升斗計者。

宜花蓋石散

皆當治。

腸澼者。東垣謂為水穀與血。另作一派。如啣桶涌出也。長夏濕熱

太甚。正當客氣盛而主氣弱。故腸澼之病甚也。總之腸風臟毒便

血腸澼四者。雖相似而各有辨。腸風由邪氣外入。隨感隨見。所以

下清血而色鮮。必在糞前。臟毒由蘊積熱毒。久而始見。所以下濁

血而色黯。必在糞後。便血兼由濕熱風虛。所以下血或清或濁。亦

不論糞前糞後。腸澼則客氣盛而正氣衰。所以血與水穀齊出。固

不可不詳審而治之也。然則腸澼之不得用腸風等藥。明矣。宜涼

黃湯當歸和血散升陽除。而其條分縷判。則有啣出之血。遠散如

濕和血湯加味香連丸。

而名曰濕毒腸澼者。

宜升陽補胃湯

有啣出血色紫黑。

腹痛惡寒。右關脉按之無力。喜熱物熨之。而由于內寒者。宜益智和中湯

有因飽食發為腸澼者。宜香有下血作派。啣出有力而遠射四散

如篩。腹中大痛者。宜芍藥黃連湯皆當治。九竅出血者。因火盛之極。故卒

然大驚。九竅皆溢出血也。宜側柏散而其條分縷判。則有九竅

四肢指岐間出血。乃暴怒所為者。宜小薊散或以井華水卒有指

縫搔痒成瘡。有竅出血不止者。宜多年糞桶箍有血自皮膚間

濺出者。宜以煮酒壘上紙揉碎如楊有胸中出血不止。乃血虛者

宜十全大補湯有遍身不論何處無故出血者。宜五皆當治。血汗者。或有

病或無病。汗出而色紅紫衣。亦謂之紅汗。內經以為少陰所至。河

間以為胆受熱而血妄行。本草以為大喜傷心。喜則氣散而血隨

氣行其不同而治之則一。宜黃芪建中湯兼服妙香散以金

命者得于大怒。氣逆陰陽奔併。不必素有病而忽吐血以

升斗計脉弦急者是也

宜六

唾血者鮮血隨唾出其原本于腎也

宜滋陰

而其條分縷判有唾中帶紅絲者乃是肺痿難治

宜人參平肺散

有由熱鬱所致者

宜河間生地黃散

有陰虛火動而唾血者

宜清

有由勞

心動火者

宜元霜雪梨膏

皆當治以上諸血症或輕或重或緩或急其原

各有所因其症各有所見如此然而一切去血過多則必致眩暈

悶絕以虛故也

宜大劑芎歸湯煎服救之全

故凡吐衄太多不止

者當防其血暈急取茅根燒烟將醋酒之令鼻嗅氣以遏其勢或

驀然以冷水噴其面使驚則止或濃磨京墨汁飲之仍點入鼻中

如此預防庶可免血暈之患至婦人崩漏及產後血症俱詳在婦

科茲不贅

脉法

靈樞曰衄而不止脉大者逆內經曰脉至而搏血衄

身熱者死又曰腹脹便血脉大時絕者死難經曰病若吐衄



脉當沉細。反浮大而牢者死。仲景曰。脫血而脉寔者難治。

脉經曰。脉得諸澁濡弱。爲亡血。脉訣曰。諸症失血。皆見芤脈。

脈貴沉細。浮大難治。正傳曰。芤爲失血。澁爲少血。又曰。亡血

之脉必大而芤。大爲發熱。芤爲失血。丹溪曰。吐衄血。脉滑數

者難治。又曰。吐唾血。脉細弱者生。寔大者死。又曰。諸失血症。脉

大且數者逆也。

論治血三法。藥各不同。繆仲淳曰。血虛宜補之。虛則發熱。內

熱法宜滋益榮血。用甘寒甘平酸寒酸溫之品。宜熟地白芍牛膝炙甘草鹿角膠

杞子人乳肉蓯蓉生地黃仁龍眼甘菊血熱宜清之。涼之熱則爲癰腫瘡癤。爲齒

齦爲鼻衄。爲牙齦腫。爲舌上出血。爲舌腫。爲赤淋。爲血崩。爲月

事先期。爲熱入血室。爲赤遊丹。爲眼暴赤腫痛。法宜酸寒苦寒

鹹寒辛涼以除是熱。宜童便生地犀角茜草山梔青黛大蓳小蘗荆芥丹皮赤芍黃芩地榆黃連大黃天

冬元血瘀宜通之。瘀必發熱發黃。作痛作腫。及作結塊。癖積。法宜辛溫辛熱辛平辛寒甘溫之劑。以入血通行。佐以鹹寒。乃可軟堅。宜當歸紅花桃仁蘇木肉桂五靈脂蒲黃姜黃鬱金三棱花蕊石韭汁左牡蠣芒硝延胡索廣虫乾漆童便沒藥丹香乳蓋血爲榮陰。也有形可見。有色可察。有症可審者也。病既不同。藥亦各異。治之之法。要在合宜而已。謹之。

論治吐血三要。繆仲淳曰。吐血宜降氣不宜降火。蓋氣有餘卽是火。氣降則火降。火降則氣不上升。血隨氣行。無溢。出上竅之患矣。降火必用寒涼之藥。反傷胃氣。胃氣傷則脾不能統血。血愈不能歸經矣。今之療吐血者。大患有二。一則耑用寒涼之味。如芩連山梔青黛柿餅灰四物湯黃柏知母之類。往往傷脾作洩。以致不救。一則專用人參。肺熱還傷肺。咳逆愈甚。亦有用參而愈者。此是氣虛喘嗽。氣爲陽。不由陰虛火熾所致。然亦百

不一二也。宜以白炙草制肝。麥冬薄荷橘紅貝母枇杷葉清肺。苡仁山藥養脾。韭菜榛香蘇子下氣。青蒿鼈甲丹皮地骨皮銀柴胡補陰清熱。杏仁茯神養心。山萸杞子牛膝補腎。此累試轉驗之方。然陰無驟補之法。非多服藥不效。病家欲速其功。醫士張皇失主。百藥雜試。以致殞命而不悟。悲夫。宜行血不宜止血。血不循經絡者。氣逆上壅也。夫血得熱則行。得寒則凝。故降氣行血。則血循經絡。不求其止而自止矣。止之則血凝。血凝必發熱惡食。及胸脇痛。病日沉痾矣。宜補肝不宜伐肝。經曰。五臟者藏精氣而不瀉者也。肝爲將軍之官。主藏血。吐血者。肝失其職也。養肝則肝氣平。而血有所歸。伐之則肝不能藏血。血愈不止矣。

辨驗血色

王海藏曰。初便褐色者重。再便深褐色者愈重。三

便黑色者尤重。色變者以其有火燥也。不可不辨。綱目曰。新血鮮紅。舊血瘀黑。又曰。風症色青。寒症色黯。暑症色紅。濕症如烟煤屋漏水。

諸血原由症治。內經曰。諸血者皆屬于心。又曰。大怒則形氣絕而血越于上。使人薄厥。又曰。怒則氣逆。甚則嘔血。入門曰。暴喜動心。不能生血。暴怒傷肝。不能藏血。積憂傷肺。過思傷脾。失志傷腎。皆能動血。正傳曰。暴喜傷心。則氣緩而心不出血。故肝無所受。暴怒傷肝。則氣逆而肝不納血。故血無所歸。又房勞過度。以致陰火沸騰。血從火起。故錯經妄行。以上皆七情動血之病也。直指曰。凡熱皆出于心。熱甚則能傷血。三因曰。凡血得熱則洋溢。故鮮。得寒則凝滯。故瘀。瘀者黑色也。鮮者紅色也。丹溪曰。諸見血皆熱症。所謂知其要者。一言而終是也。

又曰血見熱則行。見寒則凝。凡口鼻出血。皆係陽盛陰虛。有升無降。血隨氣上。越出諸竅。法當補陰抑陽。氣降則血歸于經也。以上皆言火熱傷血之病也。靈樞曰。卒然多飲食。則脹滿。起居不節。用力過度。則陽絡脈傷。傷則血外溢而衄。陰絡脈傷。則血內溢而後血。內經曰。血由上竅出。爲血溢。由大小便出。爲血洩。以上皆言內傷失血之病也。丹溪曰。血妄行于上。則吐血。衄。衰涸于下。則虛勞。忘返于下。則便紅。積熱膀胱。則癰閉尿血。滲漏腸間。則爲腸風濕壅。熱瘀則爲滯下。熱極腐化。則爲膿血。火極似水。則紫黑。熱勝于陰。則發瘡瘍。濕滯于血。則發痛癢。癢疹皮膚。則爲冷痺。畜之在上。其人喜忘。畜之在下。其人喜狂。以上言諸失血病也。入門曰。凡血逆行難治。順行易治。無潮熱者。輕。有潮熱者。重。潮盛脉大者。死。九竅血。身熱不得卧者。卽死。

東垣曰。諸血症。身熱脉大難治。身涼脉靜易治。又曰。血溢上行。或吐。或唾逆也。凶也。右變而下行。爲惡痢。順也。吉也。故仲景云。畜血症下血者。當白愈。無病人。忽然下血利者。其病進也。今病血症上行。而復下行。爲惡痢者。其邪欲去。是知吉也。仲景曰。吐血欬逆上氣。脉數有熱。不得卧者。死。直指曰。無故忽然瀉下惡血。名曰心絕難治。又曰。傷寒太陽症。衄血者。病欲愈。熱結膀胱。血自下者。亦欲愈。觀此。則他病伏熱之人。上焦瘀熱而作吐者。亦病之欲愈也。雖然。血既吐而自止。則可矣。以上皆言諸血病之吉凶也。丹溪曰。凡藥治血。不可單行。單止及純用寒涼。如用須酒炒酒煮。又曰。血症久服藥不效。以川芎爲君。乃效也。入門曰。若嘔吐血出未多。必有瘀在胸膈。當先消瘀而涼之止之。消瘀宜犀角地黃湯。又曰。治血防風爲上使。連喬黃

連爲中使。地榆爲下使。不可不知。東垣曰。血不足。用甘艸。血瘀黑。用熟地。血鮮血。用生地。若脉洪寔痛甚。用酒大黃。和血止痛。用當歸。以上言治血藥法也。

咳紅導引法。保生秘要曰。坐定瓦子上。以雙手搭項。蹲身閉氣三七口。如氣稍急。微微放之。放而又閉。日行五次。兼用運法。極妙。

運功。保生秘要曰。良念數日。縱胸前推開。次運湧泉水洗心。或封固臍凝守。

蓄血瘀血。鬱積也。而瘀血之鬱積。當有上中下之分。如衄嘔唾吐血。皆屬上部。苟蓄于此。其症必兼善忘。宜犀角地黃湯血結胸中。則屬中部。苟蓄于此。其症必兼胸滿身黃。漱水不欲嚥。宜桃仁承氣湯血凝下焦。又屬下部。苟蓄于此。其症必兼發狂。糞黑。小腹硬痛。須盡下黑物。

爲效。

宜抵當湯抵當丸

醫者能分三部治之。蓄血之症。無遁情矣。而仲景

云。傷寒熱病。身黃尿黑。發狂喜忘者。爲蓄血。仲景云然者。乃是傷寒熱病。亦有蓄血之症。非蓄血止。屬傷寒熱病。纔有之也。治之之法。雖大畧相同。而倘由傷寒熱病者。則必隨本症而調劑治之。與單病蓄血者。應稍殊也。

蓄血原由症治

海藏曰。喜忘發狂。身黃尿黑。疾已甚也。但小

腹滿。小便不利者。輕也。

直指曰。蓄血外症。痰嘔燥渴。昏憤。迷

忘。常喜湯水沃口。

入門曰。凡病日輕。夜重。便是瘀血。又曰。通

治三焦蓄血。生地黃湯。

丹溪曰。生韭菜汁。善治胸膈間瘀血。

甚效。

綱目曰。瘀血燥結。宜用玉燭散。

直指曰。下焦蓄血。宜

桃仁五靈脂。生地大黃甘草。利而逐之。

本草曰。沒藥蘇木水

蛭虫。桃仁五靈脂。留尖。皆破瘀血。

火

蓄血

脫血

卷十七

三十六



脫血衝脉病也。靈樞經曰：衝脉爲血之海，血海不足，則身少血色，面無精光，是名血脫。又曰：血脫者，色白，天然不澤，其脉空虚。然則據經之言，脫血之症，固由衝脉不足，但其所以不足之故，有由先天賦畀本來衰弱，而後天又不能培養，以致阨然如不勝衣者；有先天賦畀本來充盛，而或因思慮過傷，或因房勞過傷，或努力過傷，或因酒食過傷，皆能虧耗真陰。真陰既虧，血自消散而不澤者，且真陰既虧，火熱愈熾，或致衄吐溺便，上下失血，而天然血不華者，凡此皆脫血之所由來也。故附列此條于諸血之後。宜四物湯榮湯加味四物湯

脫血原由症治 內經曰：臂多青脉，曰脫血。又曰：安卧脉盛謂之脫血。東垣曰：六脉弦細而澁，按之空虚，其色必白，而天不澤者，脫血也。鰲按：靈樞謂鼻頭色白者爲亡血，身少血色面

無精光者。為脫血。則知亡血之色之白。僅在鼻頭。而脫血之色之白。且由面而及于一身。此其所以異也。亡血者。即諸失血也。乃一時暴來之病。非若脫血為由內而漸致之病也。

治諸血方一百零三

理中湯

氣虛 人參 白朮 炙草 乾姜

槐花散

吐血 槐花二兩 百草霜五錢 每末二錢 茅根湯下

神傳膏

又 剪草一斤洗淨晒為末入生蜜二斤和為膏忌鐵器盛磁瓶內一日一蒸九蒸九晒乃止病人五更面東坐勿言語挑膏四匙食之良久以粥湯壓之藥只冷服米湯亦勿太熱或吐或否總不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽血妄行每服一匙可也 上部血須用剪草丹皮天冬麥冬許學士云剪草治勞瘵吐血損肺及血妄行

米蓮散

又 糯米五錢 蓮子心七枚為末酒服多效或以墨汁作丸服之

黃明膠散

又 黃明膠炙乾 花桑葉陰乾 各二兩研末每三錢生地汁調下

火

脫血 諸血方

生地黃膏

又 生地一斤打汁入酒少許以熟附兩半去  
皮臍切片入汁內石器煮成膏取附片焙乾入  
山藥三兩研末以膏搗丸空心米飲下三十九

柏葉散

又 柏葉為末米飲調下二方寸七

香附散

又 香附為末每服二錢童便調下

蒲黃湯

又 蒲黃末三錢煎湯服 每日溫酒或冷水  
調服亦可

人中黃散

又 人中黃為末 每服四錢或三錢用茜根  
汁姜汁竹瀝和勻服之

乾藕節散

又 乾藕節為末酒服方寸七日二次

阿膠湯

又 阿膠二兩 蒲黃六合 生地三升 水  
五升煮三升分服

茜根煎

可 茜根一兩為末 每末二錢水煎冷服亦  
可水調服

十灰散

咯血 大蘗 小蘗 柏葉 荷葉 茅根  
茜根 丹皮 櫻皮 大黃 梔子黃 等分  
燒存性研末或藕汁或萊菔汁磨京墨半匙下

五錢立止

花蕊散

又 花蕊石煨研極細 童便一杯煎溫調服  
三錢或五錢男用酒一牛女用醋一牛與童便

和服亦可總使瘀化黃水再調治

### 四物湯

又川芎 當歸 白芍 熟地各一錢二分  
半水煎服 一方春倍川芎夏倍白芍秋倍  
地黃冬倍當歸 又方春加防風夏加黃芩秋  
加天冬冬加桂枝 當歸和血歸經白芍涼血  
補腎生地黃生血寧心熱地黃補血滋腎川芎  
行血通肝 劉宗厚曰欲求血藥其四物之謂  
乎夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行  
血滯于氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘  
寒能生真陰之虛者也當歸分三治血中主藥  
也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其經也  
白芍陰分藥也通脾經性味酸寒能涼血又治  
血虛腹痛若求陰藥之屬必于此而取則焉  
又犀角 生地 黃連 黃芩 大黃

### 犀角地黃湯

### 青餅子

又青黛一兩 杏仁以牡蠣粉炒過一兩  
研勻黃蠟化和作三十餅子每服一餅以乾柿  
半個夾定濕帛包煨香嚼食粥飲送下日三

### 薏苡仁散

又薏苡仁為末以熟豬肺切蘸空心食之苡  
仁補肺豬肺引經也

### 補陰丸

砂仁 龜板 杞子 黃柏 知母 杜仲  
咳血 甘草 五味子 側柏葉 用豬脊髓

火

諸血方

卷十七

二十八

地黃膏爲丸

紫苑丸

又紫苑 五味子 等分蜜丸芡子大含化

桑白皮散

又鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮

海犀膠散

又海犀膠即水膠一大片炙黃塗酥再炙研末每三錢白湯化服

白虎湯

石膏 知母 粳米 竹葉

青黃散

又青黛 蒲黃各一錢 新汲水服之或青黛髮灰等分生地汁調下亦可

桑耳塞鼻丹

又桑耳炒焦爲末每發時以杏仁大塞鼻中數次即可斷

石膏牡蠣丸

又石膏五錢 牡蠣一兩 每末方寸七酒服蜜丸亦可日三次

人中白散

又人中白新瓦上焙乾入麝少許溫酒調服立效

荊芥散

又荊芥炭 每二錢研陳皮湯下不過二服也

沈氏止衄丹

又香附二兩 川芎一兩 黑山梔 黃芩各五錢 共爲末每服二錢開水下不過一服即止重者亦止二三服此金絲白製方也用之無不驗

清胃湯

牙血 升麻 當歸 黃連 生地 丹皮

白芷散

又

木賊煎

舌血 木賊草煎水漱之立止

塗舌丹

列 烏賊骨 蒲黃 等分炒為細末塗舌上

紫金沙丸

又 紫金沙即露蜂房頂上窪處一兩 貝母 四錢 藍蒼三錢 蜜丸芥子大每一丸水一小杯煎五分溫服 如吐血溫酒調服

小蘗飲子

小蘗 萬節二錢 當歸一錢 山梔八分 生地 滑石 通草 蒲黃各五分 甘草三分 竹葉七片

金匱腎氣丸

又 熟地八兩 山藥 山萸各四兩 丹皮 茯苓 澤瀉各三兩 附子 肉桂 車前子 牛膝各一兩

茅根湯

又 茅根 姜炭 等分入室一匙水二杯煎

參芪蘿菥散

又 人參 藍黃芪 等分為末用紅皮大蘿菥一枚切四片用蜜二兩將蘿菥連片燉炙冷

火 諸血方

卷十七 三

乾再炙勿令焦蜜燻為度每用一斤藥食之

仍以鹽湯送下以差為度

龍胆草湯

龍胆草一虎口 水五升煮二升半分五

鬱金散

鬱金 槐花各一兩 每末二錢淡豉湯

龍胃散

龍骨煨為末每服方寸七日三

二草丹

金陵草即旱蓮草 車前草各等分搗汁

槐花散

槐花二錢 蒼朮 厚朴 陳皮 當歸

加減四物湯

枳殼 生地 當歸 川芎 炙甘草各五分 烏梅一

枚 姜三片

地榆散

地榆 卷柏各五錢 砂瓶煮十餘沸溫

平胃地榆湯

便血 蒼朮 升麻 炮附各一錢 地榆七

分 葛根 厚朴 白朮 陳皮 赤苓各五

分 乾姜 當歸 神麴 白芍 益智仁

結陰丹

人參 炙草各三分 姜三 棗二

皮 枳殼 威靈仙 黃芪 陳皮 椿根白

皮 首烏 荆芥穗各五錢 米糊丸每五七

十九米湯少入醋下

清臟湯

又山梗 生地一錢 酒洗當歸 地榆各八分  
阿膠 側柏葉各六分 川芎 白芍 黃連 槐角各五分

榆砂湯

又炙草一錢 地榆四兩 砂仁七枚 生甘草錢半

黃土湯

又阿膠 灶中黃土三錢 熟地 白朮 附子

赤小豆歸散

又赤小豆五兩 漿水調服二錢 日三服 當歸一兩

連殼丸

又炒去連殼 枳殼各二兩 到以槐花四兩全

當歸承氣湯

又芒硝七分 歸二錢 厚朴 枳實 大黃各八分

地榆甘草湯

又二錢入砂仁末一錢煎煮半分二服 每末五錢水

蒼朮地榆湯

又前溫服 蒼朮二兩 地榆一兩 分二帖水煎食

大蒜丸

又無所忌 此藥甚妙 大蒜九蒸更佳 仍以冷蘆

火

諸血方



旱蓮草散

又旱蓮草瓦上焙研末每服二錢米湯下

乾柿散

又乾柿燒存性湯服二錢愈 有人患此半

白朮丸

又白朮一斤七炒研末 生地半斤飯上蒸

槐角丸

又槐角去梗炒一兩 地榆 酒常歸 麩炒枳壳 防風 黃芩各五錢 酒糊丸米飲下五十丸

蒲黃散子

又蒲黃末二兩 每方寸匕水調下服盡止

熟附子丸

又熟附子去皮 枯礬各一兩 每末三錢米飲下 又生薑三錢半水煎或加鹽

山楂子散

又山楂淨白為末 艾湯調下應手而效

桑寄生散

又桑寄生為末每服一錢非時白湯點服

黃連丸

又黃連四兩 作四分一生研一炒研一炮研一水浸晒研 條芩一兩 防風一兩 酒糊丸每五十丸米汁浸枳壳水送下 冬月加酒蒸大黃一兩

酒蒸黃連丸

又黃連四兩酒浸一宿晒乾為末酒糊丸熟水下三五十九

烏梅丸

又烏梅三兩燒存性醋煮米糊丸每空心米飲下二十九日三

檮白皮散

又檮白皮人參各一百每末二錢空心溫酒調服米湯亦可忌油膩濕麵青菜果子甜物雞猪魚羊蒜薤等

木饅頭散

又木饅頭燒存性校灰烏梅肉炙甘草等分每末二錢水一盞煎服

加味逍遙散

又丹皮白朮各錢半當歸赤芍桃仁貝母各一錢山梔黃芩各八分桔梗七分青皮五分甘草三分

清肺湯

又赤苓陳皮當歸生地赤芍天冬麥冬山梔黃芩紫苑桑皮阿膠珠各七分甘草三分東二枚烏梅一

山梔地黃湯

又山梔錢二分生地赤芍知母貝母瓜蒌仁各一錢花粉丹皮麥冬各五分

天門冬湯

又天冬遠志白芍藕節麥冬黃芪阿膠沒藥當歸生地各七分人

參 甘草各三分 姜三片

清火滋陰湯

又 天冬 麥冬 生地 丹皮 赤芍 山  
栞 黃連 山藥 山黃 澤瀉 甘草 赤  
苓各七分 加童便

葛黃丸

咽血 黃連四兩 葛花三兩無則葛根代之  
用大黃末水熬成膏為丸溫水下百丸

是齋白朮散

又 白朮二錢 人參 黃芪 茯苓各一錢  
山藥 百合各七分半 甘草五分 前胡  
柴胡各二分半 姜三 連二

四生丸

又 生荷葉 生艾葉 生側柏葉 生地黃  
葉如無以鮮生地代 等分搗爛丸如雞子大  
每取一丸水一盞煎服或鹽湯化服亦可 一

側柏散

又 側柏葉蒸乾二兩半 荆芥穗炭 人參  
各一兩 每末三錢入白麵二錢新汲水調如  
稀糊服

七生湯

又 生地 生荷葉 生藕節 生茅根 生  
韭菜各一錢 生薑五錢 右共搗取自然汁  
一碗濃磨京墨同服

涼血地黃湯

陽荷 知母 黃柏各錢半 熟地 當歸

當歸和血散

當歸 升麻各錢半 槐花 青皮 荆芥 白朮 熟地各七分 川芎五分 共為末每二錢空心米飲下 一名槐花散

升陽除濕和血湯

白芍錢半 黃芪 炙草各一錢 陳皮 升麻各七分 生地 丹皮 生甘草各七分 當歸 熟地 蒼朮 秦艽 肉桂各三分

加味香連丸

黃連 淡吳萸各一兩 木香一錢 煨白豆蔻一錢半 乳香 沒藥各錢二分 水浸烏梅肉搗丸每三十九粒甘草湯下

升陽補胃湯

白芍一錢半 升麻 羌活 黃芪各一錢 生地 熟地 獨活 柴胡 防風 肉桂 炙草各五分 當歸 葛根各三分

益智和中丸

白芍一錢半 當歸 黃芪 升麻 炙草各一錢 丹皮 柴胡 葛根 半夏 益智仁各五分 桂枝四分 肉桂 炮姜各二分

香殼丸

黃連一兩 枳殼 厚朴各五錢 當歸 四錢 荊芥穗 木香 黃柏各三錢 刺楸

火

諸血方

皮一个燒灰 麵糊丸 溫水下五七十九日二服 一名加味連壳丸

芍藥黃連湯

又 白芍 黃連 當歸各二錢半 炙草一錢 大黃五分 內桂二分半

沈氏犀角湯

九釐血 犀角磨汁 黃連 荆芥炭 小蘗 各一錢 龍骨生研八分 黃芩錢半 人參

五分 水二杯煎一杯入側柏汁五匙服 此金鰲自製方也用之效

小蘗散

又 小蘗 百草霜 香附 蒲黃炒各用五錢 馬末或搽或擦牙立止

五花湯

又 水芦花 紅花 槐花 茅花 白鷄冠花 等分水煎服

黃芪建中湯

血汗

妙香散

又

定命散

又 朱砂 寒水石 麝香 等分每末五分 新水調下

六齋湯

薄厥症 香附 蒼朮 神曲 山梔子 連 荷 陳皮 川芎 赤苓 貝母 枳壳 蘇 藥各一錢 甘草五分 姜三

滋陰降火湯

唾血 白芍錢三分 當歸錢二分 熱地 麥冬 白朮各一錢 酒生地八分 陳皮七

分 炮知母 鹽黃柏各五分 姜三 棗二

人參平肺散

又 桑皮二錢 人參 知母 地骨皮 炙  
草各一錢 天冬 赤苓各八分 陳皮 青  
皮各五分 五味子二十粒 姜三片

河間生地黄散

又 杞子 柴胡 黃連 地骨皮 天門  
冬 白芍 黃芩 黃芪 生地 熟地  
生甘草各七分

清唾湯

又 知母 貝母 桔梗 黃柏 鹽水炒 熟  
地 元參 天冬 遠志 麥冬各一錢 姜  
炭五分

元霜紫雪膏

又 雪梨六十個去心打取汁二十鍾酸者不  
用 生藕汁十鍾 生地汁十鍾 麥冬煎濃  
汁五鍾 生萊菔汁五鍾 白茅根汁十鍾  
右汁合和重濾去渣火上煎煉入煉蜜一斤  
糖八兩柿霜八兩姜汁半酒杯火上再熬如稀  
糊收好每服三五匙日三次不拘時

芎歸湯

貯壺

生地芩連湯

又 生地 川芎 當歸各錢半 赤芍 山  
梔 黃芩 黃連各七分 防風二錢 水煎

徐徐呷下

此方兼治男子失血過多女人崩漏過度因而  
涸燥循衣摸床撮空閉目不省揚手擲足錯語  
失神鼻乾氣粗并及眩暈皆危症也以此救之  
又白芍 升麻各一錢 防風 羌活 獨活  
柴胡 歸身 葛根 甘草各七分 芎  
芢 藁本各五分 生地 熟地各四分 蔓  
荊子 細辛各三分 紅花二分  
此方兼治崩漏太冬昏冒不省閉目無所知覺  
蓋因血暴亡也血去則心神無所養暴損氣血  
豈能久活常補而升舉之以助其陽則目張神  
不昏迷矣此方補血養血生血益陽以補手足  
厥陰之不足

治蓄血方五

犀角地黄湯

犀角二錢 生地三錢 赤芍二錢 犀角鎊 丹  
皮各一錢 一方加當歸黃芩黃連各一錢

桃仁承氣湯

桃仁 甘草 桂枝 大黃 芒硝

抵當湯

高

抵當丸

又

生地黃湯

總治 生地汁一升無則用乾生地二兩 乾漆五錢 生藕汁半升無則用刺薊汁升半 生藍葉汁半升無則用乾未半升 重至二十个炒 水蛭十个炒 大黃一兩 桃仁研五錢 水一升同熬至二升放冷分二服先服至半日許血未下再服之 此藥比抵當湯尤甚輕恐服抵當湯丸下血不止故以此主之 此方端治蓄血症脉沉細微虛冷臍下滿或狂或躁大便秘色黑小便自利老幼氣弱者尤宜

治脫血症方四

四物湯

總治 川芎 當歸 白芍 生地

三才湯

又 熟地 天冬 人參 蜜丸酒飲任下百丸

加減四物湯

又 側柏葉 生地 當歸 川芎各一錢 枳壳 荊芥 槐花 炙草各五分 姜三烏梅一

補榮湯

又 當歸 白芍 生地 熟地 赤苓 山梔 麥冬 陳皮各一錢 人參 甘草各五分 重二枚 烏梅一个





讀書近况

卷四

四

噯氣嘈雜吞酸惡心源流

沈金鰲撰

噯氣嘈雜吞酸惡心皆火病也。噯氣者卽內經之噫氣。經云五氣所病心爲噫。又云寒氣客于胃厥逆從下上散復出于胃故爲噫。竊按噯氣一症總由胃弱不和三焦失職。經云寒氣客胃者必先有火鬱于胃中又爲客寒所遏清無所歸而不得升濁無所納而不得降。又或挾痰或挾食或挾氣故隨胸中之氣而上逆也。宜香附散而致噯之原更有由脾肺鬱者。有由胃陽虛者。脾肺鬱宜杏仁枯曲胃陽虛宜生白朮茯苓益智厚朴半夏曲皆當詳察。嘈雜者卽心嘈。內經云飲入于胃游溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺。又云脾主爲胃行其津液。則知胃陽易燥必賴脾陰養之脾陰易濕必賴胃陽運之若表裏不和則鮮冲和之氣致生嘈雜之病。其原有火動其痰者必痰多脉滑而數當先治痰次治火。宜二陳湯加黃芩黃連有食鬱作熱者必

脉數寔而大。當先治火。次消導。宜生地黃芩木通有濕痰壅盛者。

必脉沉而滑。當去濕消痰。宜二有氣鬱胸膈者。必脉沉而澁。當開

鬱理氣。宜氣鬱湯又有嘈雜至于醋心吐水者。宜枳櫟有嘈雜醋心。上

攻直至咽喉者。宜吳茱萸湯有嘈雜由心陽熱而心中煩。頭汗洩者。宜

神淮小麥朱砂有婦人時患嘈雜。皆血液汗淚。變而為痰。或言是血

嘈。多以猪血炒食自愈。蓋以血導血歸原之意也。即或虬虫作嘈

雜。至得血腥亦飽伏也。又有肝陰虛。經水十日半月一至夜分多

嘈雜者。宜生地阿膠天冬皆當詳察。若酸者。鬱滯日久。伏于脾胃。

間。不能自出。又嘔不下。倘肌表復遇風寒。則內熱愈鬱。而酸味刺

心。肌膚得溫煖。則腠理開發。或得香熱湯丸。則津液流通。鬱熱暫

解。宜二陳湯或有食已吞酸。則因于胃氣虛冷。宜吳茱萸炮姜等分

分八另有吐酸。吐出酸水如醋。是津液鬱積日久。濕中生痰。故從火。

化。遂。作。酸。味。隨。上。升。之。氣。而。吐。也。宜平胃散加木香。砂仁。查肉。神曲。惡。心。者。由。痰。凝。胃。脘。或。濕。熱。壅。遏。膈。中。故。欲。吐。不。吐。欲。嘔。不。嘔。心。中。兀。兀。如。畏。舟。車。者。然。宜橘紅。半夏。山梔。黃連。此。四。者。皆。胃。家。之。病。而。治。之。之。法。固。不。離。乎。胃。矣。而。亦。有。時。不。揣。主。胃。者。蓋。胃。司。納。食。主。乎。通。降。通。降。則。無。此。四。者。之。病。其。所。以。不。通。降。而。生。病。之。故。皆。由。肝。氣。冲。逆。阻。胃。之。降。也。古。人。胃。病。治。肝。是。有。見。于。此。所。以。噯。氣。嘈。雜。吞。酸。惡。心。諸。症。于。理。胃。藥。中。必。加。平。肝。之。品。也。

噯氣等原由症治 靈樞曰。足太陰之脉病。是動則病。腹脹善

噯。內經曰。太陰病。所謂上走心為噯者。陰盛而上走乎陽明。陽明終屬心。故上走而噯也。脉經曰。寸脉緊。寒之寔也。寒在上焦。胸中必滿而噯。仲景曰。上焦受中焦之氣未和。不能消。故能噯。又曰。上焦之氣不至其部。則物不能傳化。故噯而吞酸。

又曰。寸口脉弱而緩。弱者。陽氣不足。緩者。胃氣有餘。噫而吞酸。食卒不下。氣填于膈上。活人書曰。傷寒噫氣。由中氣不交故也。少陰經至胸中。交于厥陰。水火相搏而有聲。故噫氣。入門曰。噫氣。轉出食氣也。胃中鬱火。膈上稠痰。飲食鬱成。宜香附石膏。半夏。南星。梔子。治之。亦治。嘈雜。又曰。氣是噫者。食罷噫。轉腐氣。甚則物亦然。濕熱所致也。氣虛噫者。濁氣填胸也。不因飲食常噫者。虛也。蓋胃有濁氣。膈有濕痰。俱能發噫也。宜六君子湯。加沉香爲君。厚朴。蘇葉爲臣。吳萸爲使。以治之。亦有善飲酒。每朝常噫不吐者。正傳曰。痰在中焦。作噫氣。吞酸。胃脘當心痛。或嘔清水。惡心。以茯苓。陳皮。半夏。甘草。白朮。蒼朮。神曲。麥芽。砂仁。川芎。草薢。仁枳。是猪苓。澤瀉。吳萸。黃連。枳。榔。木香。山梔。之類。治之效。又曰。河間原病式言酸者。肝木之味。由火盛尅金。不能

平木則肝木自甚。故爲酸。是以肝熱則口酸也。所以中酸不宜食粘胃油膩者。謂能令氣鬱不通暢也。丹溪曰。俗謂之心嘈似飢不饑。似痛不痛。而有懊惱不自寧之況。其症或兼噯氣。或兼痞滿。漸至胃脘作痛。皆痰火爲患也。治法以半夏橘紅輩消其痰。芩連石膏梔知母輩降其火。二朮芍藥輩健脾行濕壯其本元則安。又曰。此乃食鬱有熱。黑山梔姜炒黃連必用之藥。又曰。內經言諸嘔吐酸皆屬于熱。以爲熱言其本也。東垣言作熱攻之必悞。則又以爲寒言其末也。

吞酸導引法 保生秘要曰。于肝經肺經二穴。掐之九九。擦亦九九。行攻後自效。

運功 保生秘要曰。先服氣凝定歸元半晌。次行胃口洗滌邪火。至轉大腸散濁復元。又凝定氣自愈。

治暖氣嘈雜吞酸吐酸惡心方九

香附散 暖氣 香附 山梔 黃連 橘紅 半夏

六君子湯 又 人參 茯苓 白朮 炙草 陳皮 半

二陳湯 嘈雜 茯苓 半夏 陳皮 甘草

白朮丸 又 白朮 南星 半夏

氣鬱湯 又 香附 蒼朮 橘紅 半夏 茯苓 貝

母 川芎 山梔 甘草 紫蘇 木香 尖

枳榔橘皮湯 又 枳榔四兩 橘皮一兩 每末方寸匕空

吳茱萸湯 又 淡吳萸 水煎頓服 有人心如蜚破服

左金丸 此二十年不發也累用有效 吞酸 黃連 吳萸

平胃散 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

呃逆源流

沈金鰲撰

呃逆火病也。經曰：諸逆衝上，皆屬于火，是也。呃逆一症，古名噦。後名欬逆，又名吃忒。其故有三：一曰熱逆，胃火干氣上逆，脈洪大而數，必口乾舌燥，面赤便秘。宜平胃散，加清火藥。陰火上炎而呃，其氣從臍下逆上，蓋上升之氣至肝而出中，挾相火也。宜山梔黃連清火，香胃。中停痰阻塞，致痰火鬱遏，不得疏洩，亦呃。宜參用二陳湯，半黃九。溫病發呃，乃伏熱在胃，令人胸滿而氣逆，逆而呃，或大下胃中虛冷，亦致呃。宜茅一曰氣呃，勞役過度，努傷中焦，丹田之氣逆而上行，故呃。惡根湯。一曰氣呃，勞役過度，努傷中焦，丹田之氣逆而上行，故呃。惡調氣。宜調氣平胃散，人參利膈湯。中氣大虛，不時發呃，惡補益。宜補中益氣湯。元氣不足，胃虛而呃，非培元不可。宜人參湯。肺氣鬱痺，面冷頻呃，總在咽喉不爽，當開上焦之痺，蓋心胸背部須藉在上清陽舒展，乃能曠達也。宜砒杷葉，川貝，鬱金，射干，通草，淡豉。痢後發呃，極為險症。宜六君湯。傷寒汗吐下後。



或瀉利日久。或大病後氣呃。為中氣極虛。宜十全大補湯。兼熱加

附桂脉沉數大。便男女傷寒。及一切雜病。手足逆冷而嘔。且呃。宜

秘宜稍加大黃橋呃逆之甚。至于短氣。急疏導之。宜紫蘇二錢。人食傷脾胃。復病

嘔吐。發呃下利。兩脉微澁。是陽氣欲盡。濁陰冲逆急候也。舍理陽

驅陰無別法。宜乾姜。吳萸。人參。茯苓。丁香。柿蒂。炮熟。附子。病後氣逆。不能歸元。致呃呃

連聲不止。聲聞屋外。宜刀豆。子。燒存性。白溫病飲水過多。氣滯呃

逆不止。宜枇杷葉。茅根。各呃而心下悸。蓋緣水氣停滯。宜二陳湯

汁。瀝姜。痰氣滯。其氣從胸中起。中州元氣鬱也。宜氣或脉小舌白氣

逆吃忒畏寒微戰。胃陽虛。肝木上犯。必議鎮肝安胃理陽法。宜代

人參。丁香。香皮。茯苓。若無別症。忽然發呃。氣從胃中而起。只是氣不順。

苓。淡乾。姜。牛。夏。若痰結碍逆而吃忒。乃為痰呃。宜先用鹽湯探吐。陰火從

宜木香。散若痰結碍逆而吃忒。乃為痰呃。宜先用鹽湯探吐。陰火從

少腹上冲呃逆。夜分轉甚。乃榮血虧傷之故。宜四物湯加知母。黃

呃而專由于火則曰火呃。

宜乾柿生姜煎服

呃而音高連聲尚為有力為

寔可治。若呃一二聲而音低者中氣稍絕而不能接續則虛之極

且發夕死。病後大發呃亦由真元之氣絕不治。一日胃寒手足冷

嘔吐無熱症脈遲瀉為胃寒之候。

宜丁香柿蒂湯

胃虛寒致胸滿而發呃

宜丁香胃家寒冷久呃不能止。

宜沉香散

腎氣自腹中赶上築于咽喉

逆氣連屬而不能出或至數十聲上下不得喘息此由寒傷胃皖

腎虛氣逆上乘于胃與氣相併經云病深者其聲噦也。

宜吳茱萸散

吐

利後胃氣虛寒手足厥冷必傷土氣。

宜理中湯加丁香白朮枳殼

或脈歇止汗

出呃逆大便溏此勞倦積傷胃中虛冷陰濁上千。

宜人參茯苓淡乾姜炒川椒代

精石炒烏梅肉

若為冷物所阻或誤投寒劑所遏至陽不得上升而呃陽

症傷寒胸中飲食未消悞服石膏人中黃之類而呃均宜散其寒

越其熱不使寒熱抑遏。

宜丁香柿蒂散

以上三者皆呃症之由也故有謂

呃症屬寒多而熱少者。又有謂呃症屬熱多而寒少者。皆一偏之見。蓋呃之爲症。總屬乎火。卽如胃寒諸症。亦必火熱爲寒所遏。而然若純由乎寒。則必不相激而逆上矣。故人有尋常並無疾病。或一張口而寒氣相襲。立時發呃者。俗名之曰冷呃。其得竟謂之冷病乎。蓋相襲者。寒氣而相襲之時。必陽氣適當上升。故寒氣一襲。陽卽不得越而呃也。若陽當下降。而非上升之時。雖寒襲之。亦必不呃也。然此偶然感發。不足爲病。非若前文三因之症。必須調治也。至如活人書所載呃逆陰症。胃寒脉細虛極。宜丁香柿蒂散呃逆陽症。發熱口苦。胸滿脉數。宜竹茹橘皮湯或柴胡湯或小入門所載痢後瀉後呃逆。宜人參白朮煎湯調痢後胃陽衰氣弱不相續而呃逆。宜補中益氣湯加飲食填塞胸中。或食物太甚噎而不下。發爲呃逆。宜生薑汁或陳湯正傳所載痰閉于上。火動于下。無別症。忽

發呃逆從胸中起。宜二陳湯加苓連。桔梗、姜、炒山梔。痰挾氣虛而呃逆。宜六君、綱

目所載胃中虛冷不能食飲水則呃逆或飲水太過或水結胸而

呃逆。宜小陷胸湯。或但飲水多而呃逆別無惡候。宜五苓散。因春所載過笑

而呃逆。宜燈草探鼻取嚏。皆所當究者也。總之呃逆甚危不得視為尋常

易瘳之症倘尋常視之危釐立見。

脉法 醫鑑曰呃逆之脉宜浮緩若弦促代急微結難治散大

者必死。

呃逆症治 入門曰呃逆當分有餘不足不足者因內傷及大

病後發其症胃弱面青肢冷便軟有餘者因外感冒燥及大怒

大飽而發其症面紅體熱便閉便軟者瀉心湯主之便閉者大

承氣湯主之。綱目曰靈樞云嘔以草刺鼻令嚏而已無息而

疾迎引之立已大驚之亦已詳此三法正是治呃逆之法今人

用紙撚刺鼻取嚏。嚏則呃逆立止。或閉口鼻氣使之無息亦立已。或作冤盜賊大驚駭之亦立已。此以噦爲呃逆。正得經旨也。謂之噦者。呃聲之重也。謂之呃者。噦聲之輕也。皆因病聲之輕重而名之也。又曰呃聲頻密相連者爲寔。可治。若半時呃一聲者爲虛。難治。多死死在旦夕。呃至八九聲氣不圓者難治。呃逆小便秘澀或腹滿者不治。脉見沉微散者死。瀉痢後呃逆及傷寒結胸發黃而呃逆俱難治。

治呃逆方二十七

平胃散

熱呃 蒼朮 厚朴 甘草 陳皮

二陳湯

茯苓 陳皮 甘草 半夏

半黃丸

又半夏 南星 黃芩 姜汁浸蒸餅丸食

茅葛湯

後姜湯下七十九  
熱呃 茅根 葛根各半斤 水三升煎升半  
每溫飲一盞噦止即停

調氣平胃散

氣呃 木香 檀香 烏藥 蔻仁 砂仁 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

人參利膈湯

又 木香 枳實 厚朴 人參 當歸 藿香 甘草 枳實 厚朴 大黃 歸身 白朮 陳皮

補中益氣湯

虛呃 人參 黃芪 歸身 白朮 陳皮 甘草 升麻 柴胡

人參理中湯

胃虛 人參 白朮 甘草 乾姜

六君子湯

痢後 陳皮 人參 茯苓 白朮 甘草 半夏

十全大補湯

虛極 肉桂 炙草 白芍 黃芪 當歸 川芎 人參 白朮 熟地 茯苓 姜朮

姜橘湯

病後 橘皮 四兩 生姜 一兩 水煎 徐呷 乃止

木香調氣湯

忽呃 木香 藿香 砂仁 蔻仁 甘草

導痰湯

痰呃 南星 半夏 茯苓 枳實 陳皮 甘草

四物湯

血虧 川芎 當歸 地黃 白芍

丁香柿蒂湯

胃寒 丁香 柿蒂 人參 茯苓 良姜 橘皮 半夏 各五錢 甘草 二錢 半 生姜 七錢 半

錢半 亦可 共為粗末 每三錢煎服 或調蘇合丸服 亦可 一方七味 各一錢 甘草 五分 煎服

沉香散

久呃 沉香 紫蘇 白蔻仁各一錢 共為末每柿蒂湯服五七分

理中湯

吐痢後 白朮 乾姜 炙草

氣鬱湯

鬱呃 香附 茯神 藿香 桔梗 木香 枳壳 厚朴 砂仁

丁香柿蒂散

寒呃 丁香 柿蒂各二錢 共為末生薑五片煎湯調下 如治傷寒呃逆每末一錢人參湯下 本方潔古治虛人呃逆加人參一錢三因方加貝母甘草等分 衛生方加青皮陳皮 易簡方加半夏生薑

羌活附子湯

羌活 附子 茴香 炮姜 木香 丁香各一錢 大鹽一撮全煎服

橘皮竹茹湯

陽虛 橘皮三錢 人參二錢 竹茹四錢 甘草一錢 姜五片 棗二枚 加白朮枳壳尤妙

小柴胡湯

又 柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

益元散

痢後 滑石 甘草

三香散

食呃 沉香 木香 蔻仁 蘇葉 藿香

小陷胸湯

水結 黃連 半夏 瓜蒌寔

生姜瀉心湯

便軟 甘草 生薑 黃連 黃芩 半夏 人參  
便閉 乾姜 大黃 芒硝 枳寔 厚朴

大承氣湯



